

				някои дехидрирани прашници могат да останат) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка			
			70 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу Склеротиниоза (бяло гниене) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), чернилка (<i>Alternaria brassicae</i>) – внася се във фаза ВВСН 20-80 (няма странични разклонения - започване на узряване: зелени семена, чувство за празни шушулки) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка		56 дни	
166.	МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ Байер България ЕООД Разрешение № 350-3/21.01.2016 г. Заповед №РД 11-13/07.01.2016 г.	84 г/кг - ипроваликарб + 700 г/кг - меден оксихлорид	150 -175 гр/дка	Лозя Мана по лозата (<i>Plasmopara viticola</i>)		Лозя – 21 дни; Домати полско производство 20 дни; Домати оранжерийно производство – 7 дни; Лук ; Маруля, Салата Диня, Пъпеш – 7 дни	втора професионална
			185 гр/дка	Домати (оранжерийно и полско производство) Картофена мана по домати (<i>Phytophthora infestans</i>)			
			185 гр/дка	Лук (полско производство) Мана по лука (<i>Peronospora destructor</i>)			
			185 гр/дка	Марули, салати (полско производство) Мана по салата (<i>Bremia lactucae</i>)			
			150 – 185 г/дка	Дини, пъпеши (полско производство) Кубинска мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)			

167.	МЕРПАН 80 ВГ Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01848-ПРЗ- 2/02.10.2023 г. Заповед №РД 11- 1250/09.06.2020 г. Заповед №РД11- 2163/20.09.2023 г.	каптан 800 г/кг	200 г/продукт/дка	Ябълка, Круша, Круши „Наши”, Дюля Срещу Струпясване (<i>Venturia</i> spp.); Гниене при съхранение (<i>Gloeosporium</i> sp.) Стемфилиум по круши (<i>Stemphylium vesicarium</i>) – внася се във фаза ВВСН 9-85 (зелените върхчета са 5 мм над люспите на пъпките – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 7- 10 дни Вода л/дка мин/макс - 80-150 л/дка	П	28 дни	втора професионална	При спазване на Закона за пчеларство- то с контактно действие Максимум 4 третириания за култура/ вегетация с минимален интервал от 10 дни - максимум 10,2 кг а.в./ха за вегетация. Да се спазва минимален интервал от 10 дни между отделните приложения.
			450 г/продукт/дка	Праскова, Нектарина Срещу Къдравост по праскови (<i>Taphrina deformans</i>) – внася се във фаза ВВСН 93-97 започва листопада- всички листа са паднали Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка	П	21 дни		
			375 г/продукт/дка	Праскова, Нектарина Срещу Къдравост по праскови (<i>Taphrina deformans</i>) – внася се във фаза ВВСН 51 (цветните пъпки са затворени, виждат се светло кафяви люспи) Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка	П	21 дни		
			225 г/продукт/дка	Праскова, Нектарина Срещу Къдравост по праскови (<i>Taphrina deformans</i>) Гъбна сачмянка (<i>Coryneum beijerinckii</i>); Фомописис (<i>Phomopsis amygdali</i>) – внася се във фаза ВВСН 59 (повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици (бял бутон) Брой мин/макс приложения – 1	П	21 дни		