

96.	МИКРОСЕД ГЕО/СОБЕК ЪП Евро ТСА с.р.л., Италия Разрешение № 01905-ПРЗ-2/10.02.2023 г. Заповед №РД 11-3046 от 22.12.2020 г. Заповед №РД 11-105/18.01.2023 г.	тефлутрин – 5 г/кг	1,2 кг/дка	Пшеница Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1	П	-	втора професионална	с несистемно действие
			1,2-1,5 кг/дка	Царевица, сладка царевица, сорго Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>), Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1				
			1,2-1,5 кг/дка	Слънчоглед, соя Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1				
			1,6 кг/дка	Домати, патладжани, пъпеши, дини, краставици Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-16 (втори същински лист – шести същински лист) Брой мин/макс приложения - 1				
			1,6 кг/дка	Фасул, зелен фасул и грах Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)	П			
			1,2-1,5 кг/дка	Картофи Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1	П			
			1,2-1,5 кг/дка	Тютюн Срещу Телени червей (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-14 (втори същински лист – четвърти същински лист) Брой мин/макс приложения - 1	П			
97.	МИЛБЕКНОК Сергис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01498–ПРЗ–2/11.01.2024 г. Заповед № РД 11-1770/21.08.2017 г. Заповед РД 11-1499 от 30.07.2019 г. Заповед № РД 11-3053/28.12.2023 г.	милбемектин - 9.3 г/л	80-20 мл/дка	Ябълка Червен овощен акар (<i>Panonychus ulmi</i>)– внася се при поява на първите подвижни форми на неприятеля (след ВВСН 69 – всички венчелистчета са паднали) – второ приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка	П	14 дни	втора професионална	SPe 8 - Опасен за пчелите С ограничено системно действие
			100-150 мл/дка	Ягоди Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), червен овощен акар (<i>Panonychus ulmi</i>) – първо приложение при поява на подвижни форми – второ приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П/О	7-8 дни		
			300 мл/дка	Портокали и мандарини Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Panonychus citri</i>), <i>Phyllocnistis citrella</i> - При поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка	П	14 дни		
			25-35 мл/дка	Декоративни видове Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) - приложение при поява на първите подвижни форми – последващи приложения при поява на вредителя До 3 бр употреби в/у едни и същи растения Брой мин/макс приложения – 10 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-70 л/дка	О	-		
98.	МИМИК СК Ниссо Кемикъл Юрп ГмбХ, Германия Разрешение № 02073-	тебуфенозид - 240 г/л	75 мл/дка	Царевица Срещу Царевичен стъблопробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) – внася се от ВВСН 30 (начало на удължаване на стъблото) Брой мин/макс приложения – 1	П	42	втора професионална	с несистемно действие