

			1,2-1,5 кг/дка	Картофи Срещу Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1	П			
			1,2-1,5 кг/дка	Тютюн Срещу Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) или ВВСН 12-14 (втори същински лист – четвърти същински лист) Брой мин/макс приложения - 1	П			
97.	МИЛБЕКНОК Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01498-ПРЗ– 2/11.01.2024 г. Заповед № РД 11- 1770/21.08.2017 г. Заповед РД 11-1499 от 30.07.2019 г. Заповед № РД 11- 3053/28.12.2023 г.	милбемектин - 9,3 г/л	80-20 мл/дка	Ябълка Червен овощен акар (<i>Panonychus ulmi</i>)- внася се при поява на първите подвижни форми на неприятеля (след ВВСН 69 – всички венчелистчета са паднали) – второ приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка	П	14 дни	втора професионална	SPe 8 - Опасен за пчелите С ограничено системно действие
			100-150 мл/дка	Ягоди Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), червен овощен акар (<i>Panonychus ulmi</i>) – първо приложение при поява на подвижни форми – второ приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка	П/О	7-8 дни		
			300 мл/дка	Портокали и мандарини Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Panonychus citri</i>), <i>Phyllocnistis citrella</i> - При поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка	П	14 дни		
			25-35 мл/дка	Декоративни видове Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) - приложение при поява на първите подвижни форми – последващи приложения при поява на вредителя До 3 бр употреби в/у едни и същи растения Брой мин/макс приложения – 10 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 50-70 л/дка	О	-		
98.	МИМИК СК Ниссо Кемикул Юрп ГмбХ, Германия Разрешение № 02073- ПРЗ-1/17.05.2023 г. Заповед № РД 11- 1037/04.05.2023 г.	тебуфенозил - 240 г/л	75 мл/дка	Царевича Срещу Царевичен стъблопробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) – внася се от ВВСН 30 (начало на удължаване на стъблото) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	42	втора професионална	с несистемно действие При спазване закона за пчеларството
			90 мл/дка	Праскови, кайсии Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост) Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка		14		
			90 мл/дка	Минимална употреба Праскови, кайсии Прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-87 (цветните пъпки са затворени – беритбена зрелост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита МИМИК СК , съгласно Приложение № 2 от		14		