

				По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по – високите – при по-силно нападение				
			100-150 мл/дка	Ябълки, круши Червен овошен акар (<i>Panonychus ulmi</i>) Внася се до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 3-5 Интеравл между приложенията – 5-7 дни Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по – високите – при по-силно нападение	П			
			100-150 мл/дка	Лозя – винени и десертни сортове Трипси (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Trips</i> spp) - Акари (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>) Внася се до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 3-5 Интеравл между приложенията – 5-7 дни Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по – високите – при по-силно нападение	П			
			100-200 мл/дка	Портокали, мандарини Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) Внася се до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 3-5 Интеравл между приложенията – 5-7 дни Вода л/дка мин/макс – 80-200 л/дка По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по – високите – при по-силно нападение	П			
			100-200 мл/дка	Маслини Маслинов плодов червей (<i>Bactrocera oleae</i>) Внася се до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 3-5 Интеравл между приложенията – 5-7 дни Вода л/дка мин/макс – 80-200 л/дка По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по – високите – при по-силно нападение	П			
			100-200 мл/дка	Райска ябълка (Каки) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) Внася се до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 3-5 Интеравл между приложенията – 5-7 дни Вода л/дка мин/макс – 80-200 л/дка По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, по – високите – при по-силно нападение				
			200-300 мл/дка	Минимална употреба Царевица и слънчоглед Телени червеи (род <i>Agriotes</i> sp.)- третиране на почвата при и/или след сеитба Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 8-50 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за липса на ефикасност или за проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита НАТУРАЛИС за разрешените в Таблица № 2 минимални употреби. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност е на лицето, което употребява продукта.				
105.	НАТЮР БРЕЙКЪР Сертис Белхим Б.В., Нидерландия Разрешение № 01505–ПРЗ- 3/02.10.2023 г.	диретрини – 40 г/л	75мл /дка	Домати, патладжан, пипер (на открито и в оранжерии) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) - при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода Л/дка мин/макс - 83 -100 л/дка	-	1 ден	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите с несистемно действие

	Заповед №11-2047/17.10.2017 г. Заповед №РД 11-2143/23.10.2018 г. Заповед №РД11-2400/02.11.2022 Заповед РД11-2181/21.09.2023 г.		75мл /дка	Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички) (на открито и в оранжерии) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		1 ден		-
			75мл /дка	Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) (на открито и в оранжерии) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		1 ден		
			60 мл/ дка	Марули, полска салата/ кълнове салата, бейби култури вкл. от род Brassica рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво листна ендивия/ широколистна (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло Срещу Листни въшки (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i>) - внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения - 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 66 -80 л/дка		2 дни		
			75мл /дка	Костилкови (праскова, нектарина) Срещу Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) – внася се при поява на неприятеля преди цъфтеж Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		3 дни		
			75мл /дка	Костилкови (кайсия, слива, череша) Срещу: Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) - при поява на неприятеля преди цъфтеж Брой мин/макс приложения - 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		-		
			75мл /дка	Люзи Срещу: Цикада (<i>Scaphoideus titanus</i>) – внася се след цъфтеж, ВВСН 75 (зърната на гроздовете са с размер на грахово зърно, гроздата да увисват) Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		3 дни		
106.	НЕМАТОРИН Г ИСК Биосайънсис Юръп АД, Белгия Разрешение № 01117– ПРЗ–4/15.11.2019 г. Заповед №РД 12-3 от	фостинзат - 100 г/кг	2 кг/дка 1,5 кг/дка	Картофи Телени червеи (<i>Elateridae spp.</i>) – внася се по време на засаждане Картофена чистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) Да не се прилага при сортове картофи с вегетационен период под 120 дни.		Картофи – 120 дни; Домати - Не се изисква	втора професионална	-