

				или проявена фитотоксичност е на лицето, което употребява продукта.				
105.	НАТЮР БРЕЙКЪР Сертис Белхим Б.В., Нидерландия Разрешение № 01505– ПРЗ-3/02.10.2023 г. Заповед № 11- 2047/17.10.2017 г. Заповед №РД 11- 2143/23.10.2018 г. Заповед №РД11- 2400/02.11.2022 Заповед РД11- 2181/21.09.2023 г.	пиретрини – 40 г/л	75мл /дка	Домати, патладжан, пипер (на открито и в оранжерии) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) - при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка мин/макс - 83 -100 л/дка	-	1 ден	втора професионална	SPe8 –Опасен за пчелите с несистемно действие -
			75мл /дка	Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички) (на открито и в оранжерии) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		1 ден		
			75мл /дка	Тиквови с неядлива кора (пъпешдия, тиква) (на открито и в оранжерии) Срещу Белокрылки (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		1 ден		
			60 мл/ дка	Марули, полска салата/ кълнове салата, бейби култури вкл. от род <i>Brassica</i> рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво листна ендивия/ широколистна (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло Срещу Листни въшки (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i>) - внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения - 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 66 -80 л/дка		2 дни		
			75мл /дка	Костилкови (праскова, нектарина) Срещу Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) – внася се при поява на неприятеля преди цъфтеж Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		3 дни		
			75мл /дка	Костилкови (кайсия, слива, череша) Срещу: Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) - при поява на неприятеля преди цъфтеж Брой мин/макс приложения - 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		-		
			75мл /дка	Лози Срещу: Цикада (<i>Scaphoideus titanus</i>) – внася се след цъфтеж, ВВСН 75 (зърната на гроздовете са с размер на грахово зърно, гроздата да увисват) Брой мин/макс приложения : 2 Интервал между прилож.(мин) – 7 Вода л/дка - мин/макс - 83 -100 л/дка		3 дни		

106.	НЕМАТОРИН Г ИСК Биосайънсис Юръп АД, Белгия Разрешение № 01117– ПРЗ–4/15.11.2019 г. Заповед №РД 12-3 от 18.01.2011 г. Заповед №РД 11- 2026 от 20.10.2016 г Заповед №РД 11-2065 от 17.10.2017 г. Заповед № РД 11- 921/30.05.2018 г. Заповед №РД 11- 2221/11.11.2019 г.	фостинзат - 100 г/кг	2 кг/дка 1,5 кг/дка	Картофи Телени червеи (<i>Elateridae spp.</i>) – внася се по време на засаждане Картофена цистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) Да не се прилага при сортове картофи с вегетационен период под 120 дни. Домати Галообразуващи нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>)		Картофи – 120 дни; Домати - Не се изисква	втора професионална	-
107.	НИМ АЗАЛ Т/С Трифолно М, Германия Разрешение № 0071- ПРЗ-4/27.06.2017 Заповед № РД 09 – 790/28.12.2002 г Заповед № РД 11- 381/09.05.2011 г., Заповед №РД 11- 1848/09.12.2015 г. Заповед №РД 11-1204/ 07.06.2017 г.	азадирахтин А-1% азадирахтин Б, В, Г, Д- 0,5 % ним-субстанция - 2,5 %	300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 400 мл/дка 400 мл/дка 300-900 мл/дка	Домати, краставици Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се при поява на акарите, При висока плътност може да се извърши четвърто пръскане на отделни силно нападнати участъци Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни Иглолистни дървесни видове Борова процесионка (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) Минимална употреба Домати Миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>) Брой мин/макс приложения – 3-4 Минимална употреба Ябълки Ябълков Пъстър миниращ молец (<i>Phyllonorycter blancardella</i>); Ябълков молец (<i>Yponomeuta malinellus</i>) - внася се при поява на първи мини по листата Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни Минимална употреба Череша, черница, праскова, кайсия <i>D.suzukii</i> – внася се при поява на вредителя Брой мин/макс приложения – 1 Минимална употреба Сливи, круши, ябълки <i>D.suzukii</i> - внася се при поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1 Минимална употреба Лозя <i>D.suzukii</i> - внася се при поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7 Минимална употреба Ягода, малина, къпина, боровинки <i>D.suzukii</i> – внася се при поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7 Минимална употреба Домати <i>D.suzukii</i> - при поява на вредителя Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7	О П П П П П П П	домати - 3 дни - 3 дни 3 дни - 3 дни при ябълки - - 3 дни	непрофесионална	