

				Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка				
			120 мл продукт/ дка	Портокали, лимони, мандарини, клементини Срещу Цитрусов червен акар (<i>Panonychus citri</i>) – внася се във фаза ВВСН 65-83 (масов цъфтеж – беритбена зрелост) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка	П	14 дни		
111.	НИТРОПОЛ В. Нюдорф Гмбх КГ, Германия Разрешение № 02101-ПРЗ-1/12.09.2023 г. Заповед №РД11-1980/23.08.2023 г.	парафиново масло - 830 г/л	0,6 л – 1,0 л продукт/ дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой- начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка 0,75 – 1,0 л продукт/100 л вода			втора професионална	SPe8 - Да не се прилага в периода на цъфтеж при цитруси
			0,94 л – 1,5 л продукт/ дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши) Срещу Червен овошен акар (<i>Panonychus ulmi</i>) – внася се във фаза ВВСН 54-56 (фаза „миши уши“-фаза „земен бутон“) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 125-150 л/дка 0,75 – 1,0 л продукт/100 л вода				
			0,6 л – 1,0 л продукт/ дка	Костилкови овощни видове (кайсии череши, праскови, нектарини, сливи) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой- начало на оцветяване) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка 0,75 – 1,0 л продукт/100 л вода				
			0,94 л – 1,25 л продукт/ дка	Костилкови овощни видове (кайсии череши, праскови, нектарини, сливи) Срещу Червен овошен акар (<i>Panonychus ulmi</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-53 (набъбване на неразцъфналите пъпки-разпукване на пъпките) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 125 л/дка				
			1,0 л – 2,24 л продукт/ дка	Цитрусови култури (лимони, мандарини, (клементини), портокали) Срещу Щитоносни въшки (<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Parlatoria pergandei</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой-начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – над 60 дни Вода л/дка мин/макс – 100-220 л/дка 1,0 - 1,5 л продукт/100 л вода				
			0,5 л – 2,24 л продукт/ дка	Цитрусови култури (лимони, мандарини, (клементини), портокали) Срещу Белокрылки (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus floccosus</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой- начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – над 60 дни Вода л/дка мин/макс – 50-220 л/дка 1,0 - 1,5 л продукт/100 л вода				
112.	ОАЗИС 5 ЕК Сумитомо Кемикал Агро Юръп С.А.С., Франция	Второ търговско име на СУМИ АЛФА 5 ЕК						
113.	ОВИТЕКС Сертис Белхим БВ, Нидерландия	парафиново масло (CAS № 8042-47-5) – 817 г/л	2000 мл/дка или 2x 1000	Грейпфрут, лимони, мандарини, портокал, помело Щитоносни въшки (<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Saissetia oleae</i> , <i>Aspidiotus nerii.</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , <i>Pericerya/Icerya purchasi</i> , <i>Ceroplastes rusci</i> , <i>C.sinensis</i> , <i>Coccus beckii</i> , <i>Coccus</i>	П	-	втора професионална	с несистемно действие