

			продукт/ дка	Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой- начало на оцветяване) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка 0,75 – 1,0 л продукт/100 л вода				
			0,94 л – 1,25 л продукт/ дка	Костилкови овощни видове (кайсии череша, праскови, нектарини, сливи) Срещу Червен ошетен акар (<i>Panonychus ulmi</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-53 (набъбване на неразцъфналите пъпки-разпукване на пъпките) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 125 л/дка				
			1,0 л – 2,24 л продукт/ дка	Цитрусови култури (лимони, мандарини, (клементини), портокали) Срещу Щитоносни въшки (<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Parlatoria pergandei</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой- начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – над 60 дни Вода л/дка мин/макс – 100-220 л/дка 1,0 - 1,5 л продукт/100 л вода				
			0,5 л – 2,24 л продукт/ дка	Цитрусови култури (лимони, мандарини, (клементини), портокали) Срещу Белокрылки (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus floccosus</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-81 (покой- начало на оцветяването на плода (частично, неравномерно)) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – над 60 дни Вода л/дка мин/макс – 50-220 л/дка 1,0 - 1,5 л продукт/100 л вода				
112.	ОАЗИС 5 ЕК Сумитомо Кемикал Агро Юрп С.А.С., Франция	Второ търговско име на СУМИ АЛФА 5 ЕК						
113.	ОВИТЕКС Сергис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 1425- ПРЗ-3/02.10.2023 г. Заповед №РД 11- 931/30.05.2016 г. Заповед №РД11- 2558/29.11.2017 г. Заповед №РД11- 1629/20.08.2018 г. Заповед №РД 11-3041 от 14.12.2021 г. Заповед №РД11- 2184/21.09.2023 г.	парафиново масло (CAS № 8042-47-5) – 817 г/л	2000 мл/дка или 2х 1000 мл/дка	Грейпфрут, лимони, мандарини, портокал, помело Щитоносни въшки (<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Saissetia oleae</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , <i>Pericarya/cerya purchasi</i> , <i>Ceroplastes rusci</i> , <i>C. sinensis</i> , <i>Coccus beckii</i> , <i>Coccus hesperidum</i> , <i>Parlatoria zizyphi</i> , <i>Planococcus citri</i>), Акари (<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eriophyes sheldoni</i> , <i>Aculus pelecassi</i> <i>белокрилки</i> (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus floccosus</i>) – внася се във ВВСН 70-79 Формиране на плод-плодовете са достигнали около 90% от крайния си размер Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	-	втора професионална	с несистемно действие
			2000 мл/дка	Ябълки, круши Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), виолетова стридоподобна щитоносна въшка (<i>Parlatoria oleae</i>), черничева щитоносна въшка (<i>Pseudoaulacaspis pentagona</i>), ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (<i>Lepidosaphes ulmi</i>), червена стридоподобна щитоносна въшка (<i>Epidiaspis leperii</i>), листозавивачки (<i>Archis rosana</i> , <i>A. podana</i>), листни въшки (<i>Eriosoma lanigerum</i> , <i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis pyri</i> , <i>D. plantaginae</i>), листни бълхи (<i>Psylla</i> spp.), акари (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Bryobia rubrioculus</i>) - ВВСН 53-57 Разпукване на пъпките-фаза „розов бутон“ Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка				
			2000 мл/дка или 2х 1000 мл/дка	Круши Обикновена крушова листна бълха (<i>Cacopsylla pyri</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-57 Разпукване на пъпките-фаза „розов бутон“ Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 2 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка				
			2000 мл/дка	Кайсии, череша, праскови, нектарини, сливи: Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), черничева щитоносна въшка (<i>Pseudoaulacaspis pentagona</i>), обикновена сливова щитоносна въшка (<i>Parthenolecanium corni</i>), виолетова стридоподобна щитоносна въшка (<i>Parlatoria oleae</i>), ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (<i>Lepidosaphes ulmi</i>), листни въшки (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis</i> spp.), листозавивачки (<i>Archips rosana</i> , <i>A.</i>				

				<i>podana</i>), акари (<i>Tetranychus spp.</i>, <i>Bryobia praetiosa</i>, <i>Aculus spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-57 Отваряне на пъпките-чашелистчетата са отворени Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка				
		2000 мл/дка		Декоративни видове и дървета Щитоносни въшки (<i>Parlatoria spp.</i>, <i>Aspidiotus spp.</i>, <i>Diaspis spp</i> /<i>Aulacaspis spp.</i>, <i>Saissetia oleae</i>, <i>Pericarya/Icerya purchasi</i>, <i>Ceroplastes sinensis</i>, <i>Pseudococcus spp.</i>), молци (<i>Napticulla centifoliella/Stigmela centifoliella</i>, <i>Hyponomeuta malinella</i>, <i>Leucoptera spp.</i>), листозавивачки (<i>Tortrix spp.</i>), листни въшки (<i>Aphis spp.</i>), акари – внася се във фаза ВВСН 53-57 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка				
		2 л/дка		Минимални употреби Ябълки Срещу Щитоносни въшки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>, <i>Parlatoria oleae</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Lepidosaphes ulmi</i>, <i>Epidiaspis leperii</i>) Листозавивачки (<i>Archis rosana</i>, <i>A. podana</i>), Листни бълхи (<i>Psylla spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали- първи развити листа) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 100 -150 л/дка				
		2 л/дка		Минимални употреби Круши, Дюли, Мушмули Срещу Щитоносни въшки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>, <i>Parlatoria oleae</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Lepidosaphes ulmi</i>, <i>Epidiaspis leperii</i>) Листозавивачки (<i>Archis rosana</i>, <i>A. podana</i>), Листни въшки (<i>Eriosoma lanigerum</i>, <i>Aphis pomi</i>, <i>Dysaphis pyri</i>, <i>D. plantaginae</i>), Листни бълхи (<i>Psylla spp.</i>), Акари (<i>Panonychus ulmi</i>, <i>Tetranychus urticae</i>, <i>Bryobia rubrioculu</i>) – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали- първи развити листа) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 100 -150 л/дка				
		2 приложения в доза 1 л/дка или 1 приложение в доза 2 л/дка		Минимални употреби Круши Срещу Обикновена крушова листна бълха (<i>Cacopsylla pyri</i>)- внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали- първи развити листа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 2 Вода л/дка - 100 -150 л/дка				
		2 л/дка		Минимални употреби Черешки, Праскови, Сливи Щитоносни въшки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>, <i>Pseudoaulacaspis pentagona</i>, <i>Parlatoria oleae</i>, <i>Lepidosaphes ulmi</i>), Листозавивачки (<i>Archips rosana</i>, <i>Archips podana</i>)-внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали - Развиване на първите листа; вижда се оста на развиващият се летораст) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 100 -150 л/дка				
		2 л/дка		Минимални употреби Кайсии, Нектарини, Джанки, Вишни Срещу Щитоносни въшки (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>, <i>Pseudoaulacaspis pentagona</i>, <i>Parthenolecanium corni</i>, <i>Parlatoria oleae</i>, <i>Lepidosaphes ulmi</i>), Листни въшки (<i>Myzus persicae</i>, <i>Aphis spp.</i>), Листозавивачки (<i>Archips rosana</i>, <i>Archips podana</i>), Акари (<i>Tetranychus spp.</i>, <i>Bryobia praetiosa</i>, <i>Aculus spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали - Развиване на първите листа; вижда се оста на развиващият се летораст) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 100 -150 л/дка				

114.	ОВИПРОН ТОП ЕК ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия Разрешение № 01627- ПРЗ-2/07.01.2021 г. Заповед №РД 11- 1954/03.10.2018 г. Заповед №РД 11-3048 от 22.12.2020 г.	парафиново масло (CAS № 97862-82-3)- 800 г/л	2000-3000 мл продукт/ дка	Цитрусови видове Срещу Щитonosни въшки: червена щитonosна въшка (<i>Aonidiella aurantii</i>), <i>Aspidiotus nerii</i> , стридоподобни щитonosни въшки (<i>Parlatoria pergandei</i>), запетаевидни щитonosни въшки (<i>Lepidosaphes beckii</i>), черна маслинова щитonosна въшка (<i>Saissetia oleae</i>); Лозова подвижна щитonosна въшка (<i>Planococcus citri</i>); Акари: <i>Panonychus citri</i> , обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Aculus pelecassi</i> ; Белокрылки: <i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus</i> <i>floccosus</i> – внася се при поява на неприятеля, между май-септември Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - по - голям от 60 дни Вода л/дка мин/макс – 150-200 л/дка 1000-1500 мл продукт/100 л вода	П	20 дни	втора професионална	Забележки: 1. При използване на Овипрон Топ ЕК, дърветата трябва да бъдат полати седмица преди пръскането. 2. Избягвайте пръскане при засушаване. 3. Не пръскайте при температури над 32 ° С, тъй като може да възникнат проблеми с фитотоксичността. 4. Не пръскайте в случай на замръзване, в периоди на засушаване и на силна влажност. 5. Не третирайте с продукта в период от 30 дни преди или след прилагането на сара или вар. 6. Не прилагайте каптан или фолпет, при круши (по-специално сорт Кристалия) една седмица преди и една седмица след прилагане на продукта. 7. Размерът на дозата и количеството вода за пръскане зависят от етапа на развитие на растенията и от интензивността на нападението. Използвайте високата доза посочена за 100 литра вода с посоченото по- малко количество вода , така че да не надвишава максималната доза продукт/дка.
			750-1000 мл продукт/ дка	Цитрусови видове Срещу Щитonosни въшки: червена щитonosна въшка (<i>Aonidiella aurantii</i>), <i>Aspidiotus nerii</i> , стридоподобни щитonosни въшки (<i>Parlatoria pergandei</i>), запетаевидни щитonosни въшки (<i>Lepidosaphes beckii</i>), черна маслинова щитonosна въшка (<i>Saissetia oleae</i>); Лозова подвижна щитonosна въшка (<i>Planococcus citri</i>); Акари: <i>Panonychus citri</i> , обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Aculus pelecassi</i> ; Белокрылки: <i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus</i> <i>floccosus</i> – внася се в комбинация с инсектицид Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - по - голям от 60 дни Вода л/дка мин/макс – 150-200 л/дка 500 мл продукт/100 л вода	П	20 дни		
			2500-3500 мл продукт/ дка	Черупкови овощни видове (лешници, орехи) Срещу Акари: лозова краста (<i>Eriophyes vitis</i>), паяжинообразуващи акари; Щитonosни и листни въшки – внася се февруари-март; Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - по - голям от 60 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 2500 мл продукт/100 л вода	П	20 дни		
			1000-2000 мл продукт/ дка	Черупкови овощни видове (лешници, орехи) Срещу Акари: лозова краста (<i>Eriophyes vitis</i>), паяжинообразуващи акари; Щитonosни и листни въшки – внася се май-август Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията - по - голям от 60 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка 1500 мл/100 л вода	П	20 дни		