				мин/макс - 10-12 Вода л/дка мин/макс – 30-100 мл/дка				
179.	**ОПТИКС ДИСПЕРС** ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю. А., Нидерландия Разрешение № 01778-ПРЗ-2/07.01.2021 г. Заповед №РД 11-2152 от 31.10.2019 г Заповед № РД 11-3084/30.12.2020 г.	фосетил-алуминий - 800 г/кг	250 г/дка	**Лозя (винени и десертни сортове)** Срещу Мана (*Plasmopara viticola*) - внася се от BBCH 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) фаза от BBCH 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) Брой мин/макс приложения - 6 Интервал между приложенията мин/макс - 10 дни при силна степен на нападение 12-14 дни при слаба и средна степен на нападение Вода л/дка мин/макс – 20-100 мл/дка	П	28 дни	втора професионална	със системно действие
			300-600 г/дка	**Цитрусови култури** Срещу *Phytophthora sp.* -внася се във фаза От BBCH 19 (наличие на напълно развити листа) Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото Интервал между приложенията мин/макс - 20 дни Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка. Количест-вото вода зависи от обема на короната.	П	14 дни		
180.	**ОПЮЛЕНТ** БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01704-ПРЗ-2/30.05.2022 г. Заповед № РД 11-719/11.04.2019 г.	пираклостробин – 200 г/л	50-100 мл продукт /дка	**Пшеница (мека, твърда),Тритикале** Срещу Септория (*Septoria rtitici),* кафява ръжда *(Puccinia recondita),* жълта ръжда (*Puccinia striiformis),* жълто-кафяви петна (*Pyrenophora tritici-repentis)* -внася се във фаза	П	35 дни	втора професионална	със системно действие