				апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен				
176.	**НОРИОС 250 СК** Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия Разрешение №01656-ПРЗ-1/23.01.2019 г. Заповед №РД 11-45/11.01.2019 г.	азоксистробин – 250 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ЗОКСИС 250 СК с Разрешение № 01512-ПРЗ-1/01.11.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита				втора професионална	
177.	**ОРВЕГО** БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01217 – ПРЗ-5/17.05.2023 г. Заповед № 11-121/29.01.2014 г. Заповед №РД 11-1114/24.06.2015 г. Заповед №РД 11-173/24.01.2017 г. Заповед РД 11-1502 от 30.07.2019 г. Заповед №РД 11-2958 от 09.12.2021 г. Заповед №РД11-1012/04.05.2023 г.	225 г/л диметоморф 300 г/кг аметоктрадин (инитиум)	70 мл/дка	**Домати (полско производство)** Обикновена /картофена/ мана (*Phytophthora infestans)* Внася се преди поява на болестта или в началото на инфекцията (ВВСН 10-89)	П	домати – 1 ден лук – 7 дни лоза – 35 дни	първа професионална	
			70 мл/дка	**Лук, за глави (полско производство)** Мана (*Peronospora destructor*) внася се не по-късно от ВВСН 48				
			80 мл/ дка	**Лоза (винени и десертни сортове)** Мана (*Plasmopara viticola*) ВВСН 53-83 (видими съцветия -зърната се оцветяват)				
178.	**ОПТИКС Р** ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю. А., Нидерландия Разрешение № 01608-ПРЗ-1/25.07.2018 г. Заповед № РД 11-1264/12.07.2018 г. Заповед № РД 11-1611/15.07.2022 г.	фосетил алуминий - 200 г/л + мед (под формата на триосновен меден сулфат) - 150 г/кг	500 г продукт /дка	**Лозя (винени и десертни сортове)** Срещу Мана (*Plasmopara viticola*) – -внася се във фаза ВВСН 53-83 (съцветията се виждат изцяло-зърната формират цвят) (винени сортове) -внася се във фаза ВВСН 53-71 (съцветията се виждат изцяло-завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат) (десертни сортове) Брой мин/макс приложения - 1-4 Интервал между приложенията	П	28 дни	втора професионална	

				мин/макс - 10-12 Вода л/дка мин/макс – 30-100 мл/дка				
179.	**ОПТИКС ДИСПЕРС** ЮПЛ Холдингс Кооператиф Ю. А., Нидерландия Разрешение № 01778-ПРЗ-2/07.01.2021 г. Заповед №РД 11-2152 от 31.10.2019 г Заповед № РД 11-3084/30.12.2020 г.	фосетил-алуминий - 800 г/кг	250 г/дка	**Лозя (винени и десертни сортове)** Срещу Мана (*Plasmopara viticola*) - внася се от BBCH 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) фаза от BBCH 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) Брой мин/макс приложения - 6 Интервал между приложенията мин/макс - 10 дни при силна степен на нападение 12-14 дни при слаба и средна степен на нападение Вода л/дка мин/макс – 20-100 мл/дка	П	28 дни	втора професионална	със системно действие
			300-600 г/дка	**Цитрусови култури** Срещу *Phytophthora sp.* -внася се във фаза От BBCH 19 (наличие на напълно развити листа) Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото Интервал между приложенията мин/макс - 20 дни Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка Приложение: 300 г продукт/ 100 л вода, кореспон-диращо на максимал-на доза 600 г продукт/дка при използване на 200 л вода/дка. Количест-вото вода зависи от обема на короната.	П	14 дни		
180.	**ОПЮЛЕНТ** БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01704-ПРЗ-2/30.05.2022 г. Заповед № РД 11-719/11.04.2019 г.	пираклостробин – 200 г/л	50-100 мл продукт /дка	**Пшеница (мека, твърда),Тритикале** Срещу Септория (*Septoria rtitici),* кафява ръжда *(Puccinia recondita),* жълта ръжда (*Puccinia striiformis),* жълто-кафяви петна (*Pyrenophora tritici-repentis)* -внася се във фаза	П	35 дни	втора професионална	със системно действие