

				растенията				
177.	НЕМАСОЛ 510 Суммит Агро България ЕООД Удостоверение № 363/08.06.2006 г. Заповед РД 09-719/29.12.2005 г.	метам содиум - 510 г/л	80-100 л/дка	Галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилий, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен		-	1	
178.	НОРИОС 250 СК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия Разрешение №01656-ПРЗ-1/23.01.2019 г. Заповед №РД 11-45/11.01.2019 г.	азоксистробин – 250 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ЗОКСИС 250 СК с Разрешение № 01512-ПРЗ-1/01.11.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита				втора професионална	
179.	ОРВЕГО БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01217 – ПРЗ-5/17.05.2023 г. Заповед № 11-121/29.01.2014 г. Заповед №РД 11-1114/24.06.2015 г. Заповед №РД 11-173/24.01.2017 г. Заповед РД 11-1502 от 30.07.2019 г. Заповед №РД 11-2958 от 09.12.2021 г.	225 г/л диметоморф 300 г/кг аметоктрадин (инитиум)	70 мл/дка	Домати (полско производство) Обикновена /картофена/ мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Внася се преди поява на болестта или в началото на инфекцията (ВВСН 10-89)	П	домати – 1 ден лук – 7 дни лоза – 35 дни	първа професионална	
			70 мл/дка	Лук, за глави (полско производство) Мана (<i>Peronospora destructor</i>) внася се не по-късно от ВВСН 48				
			80 мл/ дка	Лоза (винени и десертни сортове) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) ВВСН 53-83 (видими съцветия -зърната се оцветяват)				

	Заповед №РД11-1012/04.05.2023 г.							
180.	ОПТИКС Р ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю. А., Нидерландия Разрешение № 01608-ПРЗ-1/25.07.2018 г. Заповед № РД 11-1264/12.07.2018 г. Заповед № РД 11-1611/15.07.2022 г.	фосетил алуминий - 200 г/л + мед (под формата на триосновен меден сулфат) - 150 г/кг	500 г продукт /дка	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – -внося се във фаза ВВСН 53-83 (съцветията се виждат изцяло-зърната формират цвят) (винени сортове) -внося се във фаза ВВСН 53-71 (съцветията се виждат изцяло-завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат) (десертни сортове) Брой мин/макс приложения - 1-4 Интервал между приложенията мин/макс - 10-12 Вода л/дка мин/макс – 30-100 мл/дка	П	28 дни	втора професионална	
181.	ОПТИКС ДИСПЕРС ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю. А., Нидерландия Разрешение № 01778-ПРЗ-2/07.01.2021 г. Заповед №РД 11-2152 от 31.10.2019 г. Заповед № РД 11-3084/30.12.2020 г.	фосетил-алуминий - 800 г/кг	250 г/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) - внося се от ВВСН 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) фаза от ВВСН 10 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста) Брой мин/макс приложения - 6 Интервал между приложенията мин/макс - 10 дни при силна степен на нападение 12-14 дни при слаба и средна степен на нападение Вода л/дка мин/макс – 20-100 мл/дка	П	28 дни	втора професионална	със системно действие
			300-600 г/дка	Цитрусови култури Срещу <i>Phytophthora sp.</i> -внося се във фаза От ВВСН 19 (наличие на напълно развити листа) Брой мин/макс приложения - 2 приложения през пролетта + 2 приложения през лятото	П	14 дни		