			3 x 10 г продукт/дка	**Билки** Почвени патогени (напр. *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.) - внася се във фаза BBCH 12-42 Брой мин/макс приложения – 2-3 Интервал между приложенията – 15-30 дни Вода л/дка мин/макс – 200-2000 л/дка Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта	П/О	-		
			3 x 12,5 г продукт/дка	**Билки** Почвени патогени (напр. *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.) - внася се във фаза BBCH 12-42 Брой мин/макс приложения – 2-3 Интервал между приложенията – 15-30 дни Вода л/дка мин/макс – 200-2000 л/дка Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта	П/О	-		
217.	**ПРОТЕКТОР 240 ЕК** Байер България ЕООД Разрешение №01595-ПРЗ-1/02.07.2018 г. Заповед № РД 11-1041/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-2072/22.10.2018 г. Заповед №РД 11-1962 от 25.08.2020 г.	протиоконазол - 80 г/л тебуконазол - 160 г/л	100 мл/дка	**Да не се прилага чрез въздушно третиране** **Маслодайна рапица, синап** Срещу Сухо стъблено гниене (Фомоза) – *Leptosphaeria maculans*) – внася се във фаза BBCH 15-30: 5-ти лист – начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия BBCH 33-51: видимо нарастване на трето междувъзлие – „зелен бутон” Брой мин/макс приложения - Макс 2 приложения /вегетационен период Вода л/дка мин/макс – 20-40 мл/дка	П	56 дни	втора професионална	
218.	**ПРОТЕНДО 300 ЕК/ ПАТЕЛ 300 ЕК** Глобахем Н.В., Белгия Разрешение № 02011-ПРЗ-3/03.04.2023 г. Заповед №РД 11-570 от 28.03.2022 г.	протиоконазол - 300 г/л	33-65 мл продукт /дка	**Пшеница (зимна и пролетна)** Срещу Кафява ръжда *(Puccinia triticina),* Жълта ръжда *(Puccinia striiformis),* Ран листен пригор *(Septoria tritici),* Жълто-кафяви петна *(Pyrenophora tritici-repentis),* Фузариози *(Fusarium sp.)* – внася се	П	35 дни	втора професионална	със системно действие При спазване на Закона за пчеларството

	Заповед № РД 11-1604/15.07.2022 г. Заповед № РД11-546/09.03.2023 г.			във фаза ВВСН 25-69 (забележими 5 братя - край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка			
			33-65 мл продукт /дка	**Тритикале** Срещу Ран листен пригор *(Septoria tritici),* Листен пригор *(Rhynchosporium secalis)* – внася се във фаза ВВСН 25-61 (забележими 5 братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
			33-65 мл продукт /дка	**Ечемик (зимен и пролетен)** Срещу Листна ръжда *(Puccinia hordei),* Мрежести петна *(Pyrenophora teres),* Листен пригор *(Rhynchosporium secalis)* – внася се във фаза ВВСН 25-61 (забележими 5 братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
			33-65 мл продукт /дка	**Ръж** Срещу Кафява ръжда *(Puccinia triticina),* Листен пригор *(Rhynchosporium secalis)* – внася се във фаза ВВСН 25-61 (забележими 5 братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни
			30-60 мл продукт /дка	**Маслодайна рапица (зимна и пролетна)** Срещу Сухо стъблено гниене *(Phoma lingam)* – внася се През есента, ВВСН 16-19 (разтворен шести лист - 9 или	П	56 дни

				повече листа оформени). През пролетта, BBCH 20-59 (няма странични разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”) Брой мин/макс приложения – 2 (1 есенно + 1 пролетно) Интервал между приложенията – 86 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка или във фаза				
			30-60 мл продукт /дка	BBCH 20-69 (няма странични разклонения -край на цъфтежа) срещу Сухо стъблено гниене *(Phoma lingam),* Склеротиния *(Sclerotinia sclerotiorum)* Брой мин/макс приложения – 2 (2 пролетни) Интервал между приложенията – 21 дни При спазване на Закона за пчеларството	П			
219.	**ПРОТЕКТОР 6 ФС** НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия	Второто търговско име на **ОРИУС 6 ФС**						
220.	**ПРОКСАНИЛ/ АКСИДОР** Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия Разрешение № 01191-ПРЗ-5/10.03.2017 г. Заповед № РД 11-1086/14.10.2013 г. Заповед №РД 11-943/29.05.2015 г. Заповед №РД 11-643/19.04.2016 г. Заповед №РД 11-1296/19.07.2016 г. Заповед №РД 11-418/02.03.2017 г Заповед РД 11-1492/30.07.2019 г.	Пропамокарб хидрохлорид – 400 г/л симоксанил – 50 г/л	200 мл/дка	**Картофи** Мана по картофи *(Phytophtora insentans)* внася се при първа поява на неприятеля BBCH 21-95 *Брой* мин/макс приложения – 6 *Интервал* между приложенията – 7 Вода мин/макс л/дка - 40 л/дка (400 л/ха)		Картофи -14 дни Домати - 3	втора професионална	
			250 мл/дк	**Домати (оранжерийно и полско производство)** Мана (*Phytophtora infestans*) внася се във фаза BBCH 21-89 –видима поява на първо връхно разклонение – пълна зрялост. Първото третиране се провежда, когато се създадат благоприятни условия за заразяване,				