		мезосулфурон-метил – 30 г/кг + Мефенпир-диетил (антидот) – 90 г/кг	30 г/дка	**Пролетна пшеница (твърда и мека):** внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел				
222.	**ПЕЛИКАН ДЕЛТА** НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ, Австрия Разрешение № 01417 – ПРЗ-2/15.11.2021 г. Заповед №РД 11-947/31.05.2016 г. Заповед №РД 11-763 от 17.04.2019 г. Заповед №РД 11-2689 от 11.11.2021 г.	дифлуфеникан - 600 г/л метсулфурон-метил – 60 г/л	7 г продукт /дка	**Пшеница (мека, твърда), ечемик, ръж, тритикале** Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето) Брой мин/макс приложения- 1 Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П	-	втора професионална	със системно и несистемно действие
223.	**ПЕНДИНОВА/ АДМЕТО** Финчимика С.п.А., Италия Разрешение № 01510 – ПРЗ-2/11.03.2022 г. Заповед №РД 11-2130/19.10.2017 г. Заповед №РД 11-228 от 17.02.2022 г. Заповед № РД11-931/10.04.2024 г.	пендиметалин – 330 г/л	400-600 мл/продукт/дка При ориз 400-510 мл/продукт/дка	**Пшеница, ечемик,ръж, ориз (сеитба на сухо)** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13) Вода л/дка Мин/макс 20-60 л/дка		-	втора професионална	със системно действие
			400-600 мл/продукт/дка	**Царевица** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели –внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-12) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			300-500 мл/продукт/дка	**Аспержи** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди прорастване на културата, по време на покой Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		28 дни		