| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Вода л/дка – 20-80 | | | | |
| | | | 250-600 мл/дка | **Декоративни растения и разсадници**<br>Внася се преди или след разсаждане<br>Брой приложения мин/макс – 1<br>Вода л/дка – 20-80 | | Ограничен от фазата на приложение | | |
| | | | 170-330 мл/дка | **Треви за семена**<br>**AGSTE**<br>**ALOPR**<br>**ARRAL**<br>**CYXCR**<br>**DECCA, LOLSS**<br>**PHLPR**<br>**POASS**<br>**FESSS**<br>**AGSST**<br>Да не се прилага при треви за храна на животните<br>Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя /растение)<br>Брой приложения мин/макс – 1<br>Вода л/дка – 20-80 | | Ограничен от фазата на приложение | | |
| **225.** | **ПЕНДИ 33 ЕК**<br>ШАРДА ЕВРОПА Б.В.Б.А., Белгия | **Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК** | | | | | | |
| **226.** | **ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ /АКТИВУС**<br>Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия<br>Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017 г. Заповед № РД11-2037/18.12.2014 г., Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г. и Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г. | пендиметалин - 330 г/л | | Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: | | 90 дни | втора професионална | |
| | | | 0,4 л/дка | **Пшеница**<br>Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата | | | | |
| | | | 0,4 л/дка | **Ечемик**<br>Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата | | 90 дни | | |
| | | | 0,4 л/дка | **Ръж**<br>Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата | | 90 дни | | |
| | | | 0,53 л/дка | **Царевица**<br>Преди поникване или след поникване във | | 90 дни | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите. |
| **365.** | **ШАДОУ**<br>Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция<br>Разрешение №01635-ПРЗ-1/07.11.2018 г.<br>Заповед №РД 11-2063/19.10.2018 г.<br>Заповед №РД 11-972 от 17.05.2022 г. | клетодим – 120 г/л | Продуктът е идентичен на ПРЗ СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК с Разрешение № 0348-ПРЗ-4/25.07.2018 г за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита | | | | втора професионална | със системно действие |
| **366.** | **ШАРНИК**<br>Шарда Кропкем Испания С.Л.<br>Разрешение №01788-ПРЗ-2/17.05.2023 г.<br>Заповед № РД 11-2631/17.12.2019 г.<br>Заповед № РД11-1035/04.05.2023 г. | никосулфурон - 40 г/л | 125 – 150 мл продукт /дка | **Царевица**<br>Срещу едногодишни житни плевели и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист –разтваряне на осми лист) на царевицата<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка | П | - | втора професионална | със системно действие |
| **367.** | **ШАРПЕН 33 ЕК**<br>**ПЕНДИ 33 ЕК/**<br>**ПЕНКОТ 33 ЕК**<br>ШАРДА ЕВРОПА Б.В.Б.А., Белгия<br>Разрешение №01279 – ПРЗ-3/14.02.2017г. | пендиметалин - 330 г/л | | Едногодишни житни и широколистни плевели | | Аспержи - 28 дни;<br>Марули, Ендивия, Цикория – 75дни;<br>Слънчоглед | Втора професионална | |
| | | | 360-600 мл/дка | **Слънчоглед**<br>Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) | | | | |
| | | | 360-600 мл/дка | **Царевица** | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заповед № РД 11-1981/10.12.2014 г., Заповед №.РД 11-193/03.02.2015 г., Заповед №РД 11-1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11-87/16.01.2017 г | | | Внася се лед сеитба, преди поникване (ССПП) | | , царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни сортове), Ябълки, круши, Кайсии, праскови,нектарини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Треви за семена(AGSTE, ALOPR, | | |
| | | | 360-600 мл/дка | **Фасул**<br>Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) | | | | |
| | | | 300-600 мл/дка | **Соя**<br>Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) | | | | |
| | | | 360-600 мл/дка | **Грах (за консервиране), нахут –**<br>Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП) | | | | |
| | | | 300-600 мл/дка | **Моркови, ряпа**<br>Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП) | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Аспержи**<br>Внася се период на покой | | | | |
| | | | 360-600 мл/дка | **Картофи**<br>Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) | | | | |
| | | | 360-600 мл/дка | **Тютюн**<br>Внася се преди разсаждане | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Пипер**<br>Внася се ССПП или преди разсаждане | | | | |
| | | | 300-600 мл/дка | **Марули**<br>Внася се ССПП или преди разсаждане | | | | |
| | | | 300-600 мл/дка | **Ендивия**<br>Внася се ССПП или преди разсаждане | | | | |
| | | | 300-600 мл/дка | **Карфиол**<br>Внася се преди разсаждане | | | | |
| | | | 300-500 мл/дка | **Цикория –**<br>Внася се преди разсаждане | | | | |
| | | | 240 мл/дка | **Козя брада**<br>Внася се ССПП | | | | |
| | | | 360 мл/дка | **Лупина**<br>Внася се ССПП | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Памук**<br>Внася се ССПП или преди разсаждане | | | | |
| | | | 280-360 мл/дка | **Топола**<br>Внася се след разсаждане | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Лозя (винени и десертни сортове)**<br>Внася се в периода на зимен покой | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 400-600 мл/дка | **Ябълки, круши,** дюли<br>Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза | | ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Кайсии, праскови, нектарини**<br>Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Овощни разсадници**<br>Внася се преди или след разсаждане | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело)**<br>Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза | | | | |
| | | | 400-600 мл/дка | **Фъстъци**<br>Внася се ССПП | | | | |
| | | | 300-730 мл/дка | **Декоративни растения и разсадници**<br>Внася се преди или след разсаждане | | | | |
| | | | 210-400 мл/дка | **Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST)**<br>Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение) | | | | |
| **368.** | **ШОГУН 100 ЕК**<br>Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия | **Второ търговско име на АЖИЛ 100 ЕК** | | | | | | |
| **369.** | **ЯСТРЕБ ПЛЮС**<br>Монсанто Европа С.А./Н.В<br>Разрешение № 01511-ПРЗ-Издание:2/17.11.2023 г.<br>Заповед № РД 11-2120/19.10.2017 г.<br>Заповед № РД11-2652/08.11.2023 г. | глифозат<br>360 г/л | 300 мл/дка | **Царевица**<br>Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се преди сеитбата на културата (плевели в активен растеж)<br>Интервал между приложенията - 1<br>Вода л/дка – 10-20 л /дка | - | 30 дни | непрофесионална | Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и |
| | | | 400-1200 мл/дка | **Овощни градини, стърнища**<br>Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – прилага се по време на Бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели (плевели в активен растеж)<br>Брой мин/макс приложения - 1<br>Вода л/дка - 15-20 л /дка | | - | | |