

				Интервал мин/макс приложения – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 40-100 л/дка				
			100 г продукт/ дка	Рапица Срещу Бяло гниене (склеротиниоза) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза Есен, пролет ВВСН 32-70 (видимо нарастване на 2 междувъзлие-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал мин/макс приложения – 10-15 Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка		56 дни		
187.	ПАРАДАЙЗ Шарда Кропкем Испания, С.Л Разрешение № 01901-ПРЗ-1/02.12.2020 г. Заповед №РД 11-2622 от 24.11.2020 г.	протиоконазол – 250 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ПРАКТИС с Разрешение № 01860-ПРЗ - Издание 1/10.07.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			втора професионална	със системно действие	
188.	ПАУЪР Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01900-ПРЗ-1/02.12.2020 г. Заповед №РД 11-2621 от 24.11.2020 г.	протиоконазол – 250 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ПРАКТИС с Разрешение № 01860-ПРЗ - Издание 1/10.07.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			втора професионална	със системно действие	
189.	ПЕРГАДО Д Синджента България ЕООД Разрешение №01646-ПРЗ-1/06.12.2018 г. Заповед № РД 11-2384/23.11.2018 г.	мандипропамид – 62,5 г/л дитианон – 250 г/л	140-200 мл/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-79(третите листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 8-12 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка	П	-	втора професионална	
190.	ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ Синджента България ЕООД Удостоверение № 01135-ПРЗ-1/20.05.2011 г.	25 г/кг мандипропамид 139,5 г/кг мед (под формата на	500 г/дка	Мана по лоза (<i>Plasmopara viticola</i>): внася се след образуване на ягоридата по лозата		21 дни лозя; 3 дни домати	непрофесионална	

	Заповед № РД 11 – 443/18.05.2011 г. Заповед № РД11-1643/10.07.2023 г.	меден оксихлорид		Мана по домати (<i>Phytophthora infestans</i>): внася се през вегетация, при наличие на критични периоди за проява на болестта		(прясна консумация) 10 консервни		
191.	ПЕРГАДО Ф 45 ВГ Синджента България ЕООД Удостоверение № 01040-3/ 21.10.2011 г. Заповед № РД 12-61/13.06.2008 г.	50 г/кг мандипропамид + 400 г/кг фолпет	200 г/дка (0,2 %)	Мана по лоза (<i>Plasmopara viticola</i>)		28 дни	1	
192.	ПИКОК Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01964-ПРЗ-1/20.07.2021 г. Заповед №РД 11-1586 от 12.07.2021 г.	фенпикоксамид - 50 г/л	150-200 мл/дка	Зимна и пролетна пшеница Твърда пшеница Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			150-200 мл/дка	Спелта Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			150-200 мл/дка	Тритикале (зимно и пролетно) Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2	П	-		