

	Заповед № РД 11 – 443/18.05.2011 г. Заповед № РД11-1643/10.07.2023 г.	меден оксихлорид		Мана по домати (<i>Phytophthora infestans</i>): внася се през вегетация, при наличие на критични периоди за проява на болестта		(прясна консумация) 10 консервни		
191.	ПЕРГАДО Ф 45 ВГ Синджента България ЕООД Удостоверение № 01040-3/ 21.10.2011 г. Заповед № РД 12-61/13.06.2008 г.	50 г/кг мандипропамид + 400 г/кг фолпет	200 г/дка (0,2 %)	Мана по лоза (<i>Plasmopara viticola</i>)		28 дни	1	
192.	ПИКОК Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01964-ПРЗ-1/20.07.2021 г. Заповед №РД 11-1586 от 12.07.2021 г.	фенпикоксамид - 50 г/л	150-200 мл/дка	Зимна и пролетна пшеница Твърда пшеница Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			150-200 мл/дка	Спелта Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			150-200 мл/дка	Тритикале (зимно и пролетно) Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2	П	-		

			Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		
	150-200 мл/дка	Миниална употреба Ръж (зимна и пролетна) Сершу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Фузариоза (<i>Fusarium graminearum</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	
	150-200 мл/дка	Миниална употреба Зимна и пролетна пшеница Твърда пшеница Спелта Тритикале (зимно и пролетно) Сершу Фузариоза (<i>Fusarium graminearum</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ПИКОК съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на	П	-	

				ПРЗ ПИКОК съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.				
193.	ПИКТОР СК БАСФ СЕ, Германия ОТНЕТО Разрешение № 01088-ПРЗ-5/07.09.2017 г. <u>Заповед № РД 12-33/26.04.2010 г.</u> <u>Заповед РД 12-6/18.01.2011 г.</u> Заповед №РД 11-1939/30.12.2015 г. Заповед №РД 11-1676/10.08.2017 г. Заповед №РД 11-1022 от 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-3047 от 14.12.2021 г. Заповед №РД11-2169-20.09.2023 Заповед № РД 11-2278/06.10.2023 Считано от 06.10.2023 г. се определя гратисен период от шест месеца за продажба и разпространение и до 31 юли 2024 г за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващите наличности от ПРЗ ПИКТОР СК с Разрешение № 01088 – ПРЗ – Издание: 5/07.09.2017 г.	200 г/л <u>димоксистробин</u> 200 г/л <u>боскалид</u>	30-50 мл/дка	Слънчоглед Алтернария (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 51 (Поява на цветен бутон между най-горните листа)	П	56 дни	втора професионална	При спазване на Закона за пчеларството за всички разрешени употреби.
			30-50 мл/дка	Алтернария (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 61 (Начало на цъфтежа: езичестите цветове се удължават; тръбестите цветове, заемащи външната третина на цветното легло, се виждат) Максимален брой третириания за сезон – 2				
			40 мл/дка	Фома (<i>Letpospheria macdonaldii</i>) – внася се във фаза ВВСН 19-65 (Девет и повече листа – пълен цъфтеж) Максимален брой третириания за сезон – 2		30 дни		
			50 мл/дка	Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotioru.</i>) първо третиране от фаза начало на цъфтеж до фаза тръбестите цветове във външната третина на питата са цъфнали (ВВСН 61-63), второ третиране във фаза пълен цъфтеж до фаза цъфтежа преминава (ВВСН 64-66) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка		30 дни		
			50 мл/дка	Фомопсис (<i>Phomopsis helianthii</i>) - първо третиране шести осми лист на културата (ВВСН 16-18), второ третиране начало на бутонизация до фаза бутон е ясно отделен от най-горните листа (ВВСН 51-57) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка		30 дни		