

			3-5 г/дка	Царевича Срещу едногодишни широколистни плевели Многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка Прибиране за фураж във фаза ВВСН 75	П	-		
228	ПИК 75 ВГ Синджента България ЕООД Удостоверение № 01031-ПРЗ-1/ 18.02.2010 г. Заповед РД 12-61/13.06.2008 г.	750 г/кг просулфурон	1,5 г/дка+ 0,2 % Атиплус с 20 л/дка работен разтвор	Царевича Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите		Зърно -не се изисква; 60 -фураж	първа професионална	
229	ПИЛОТ УЛТРА Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция Разрешение № 01947-ПРЗ-1/15.06.2021 г. Заповед №РД 11-1125 от 01.06.2021 г.	хизалофоп-П-етил - 50 г/л	100-150 мл/дка	Моркови Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 11-47 (разтворен първи същински лист – 70 % от очаквания диаметър на корена е достигнат) при плевелите: ВВСН 16-41 на едногодишните (6 истински листа - удължаване на флаговия лист) ВВСН 12 на многогодишните (2 истински листа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	21 дни	втора професионална	

			150-300 мл/дка	Моркови Срещу многогодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 11-47 (разтворен първи същински лист – 70 % от очаквания диаметър на корена е достигнат) при плевелите: ВВСН 16-41 на едногодишните (6 истински листа - удължаване на флаговия лист) ВВСН 12 на многогодишните (2 истински листа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка + 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	21 дни		
			100-150 мл/дка	Захарно цвекло Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-49 (разлистени 3 листа – кореноплодите са в техническа зрялост) при плевелите: ВВСН 12-22 на едногодишните (2 истински листа – 2 видими братя) ВВСН 12-32 на многогодишните (2 истински листа – 2 видими удължени междувъзлия) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена	П	60 дни		

				в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка				
			150-300 мл/дка	Захарно цвекло Срещу многогодишни житни плевели – внося се във фаза ВВСН 13-49 (разлистени 3 листа – кореноплодите са в техническа зрялост) при плевелите: ВВСН 12-22 на едногодишните (2 истински листа – 2 видими братя) ВВСН 12-32 на многогодишните (2 истински листа – 2 видими удължени междувъзлия) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	60 дни		
			100-150 мл/дка	Домати Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза ВВСН 11-81 (първи същински лист на основното стъбло – 10% от плодовете с типичен цвят на зреене) при плевелите: ВВСН 15-28 на едногодишните (5 истински листа – 8 видими братя) ВВСН 21-29 на многогодишните (братене) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	21 дни		

			150-300 мл/дка	Домати Срещу многогодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 11-81 (първи същински лист на основното стъбло – 10% от плодовете с типичен цвят на зреене) при плевелите: ВВСН 15-28 на едногодишните (5 истински листа – 8 видими братя) ВВСН 21-29 на многогодишните (братене) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	21 дни		
			100-150 мл/дка	Зелен фасул с шушулки Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 11-69 (един развит лист – край на цъфтежа; първите чушки се виждат) при плевелите: ВВСН 20-30 на едногодишните (начало на братене – начало на удължаване на стъблото) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	21 дни		
			150-300 мл/дка	Срещу многогодишни житни плевели				
			100-150 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 11-50	П	90 дни		

			150-300 мл/дка	(разтворен първи лист – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа) при плевелите: ВВСН 13-27 на едногодишните (3 истински листа – 7 видими братя) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка Срещу многогодишни житни плевели				
			100-150 мл/дка	Слънчоглед Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза ВВСН 11-51 (първи лист – поява на цветен бутон между най- горните листа) при плевелите: ВВСН 13-23 на едногодишните (3 истински листа – 3 видими братя) ВВСН 13-20 на многогодишните (3 истински листа – начало на братене) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	45 дни		
			150 мл/дка	Срещу многогодишни житни плевели				

			100-150 мл/дка Картофи Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза ВВСН 11-74 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (>4 см) – 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер) при плевелите: ВВСН 12-23 на едногодишните (2 истински листа – 3 видими братя) ВВСН 22-24 на многогодишните (2 видими братя – 4 видими братя) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка 150-300 мл/дка Срещу многогодишни житни плевели	П	45 дни		
--	--	--	---	---	--------	--	--

			100-150 мл/дка Памук Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза ВВСН 11-76 (първи същински лист разтворен – приблизително 60% от семенниците достигат крайния си размер) при плевелите: ВВСН 16-23 на едногодишните (6 истински листа – 3 видими братя) ВВСН 16-35 на многогодишните (6 истински листа – 5-ти стъблен възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка 150-300 мл/дка Срещу многогодишни житни плевели	П	45 дни		
			100-150 мл/дка Соя Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза ВВСН 11-49 (разтваря се първата двойка същински листа – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните си размери) при плевелите: ВВСН 11-23 на едногодишните (първи същински лист – 3 видими братя) до ВВСН 43 на многогодишните (начало на оформяне на класа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка	П	90 дни		

				Срещу многогодишни житни плевели				
230.	ПИТОН 75 ВДГ Зенит Кроп сайансис България ЕООД	Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ						
231.	ПЛЕДЖ 50 ВП Суммит Агро България ЕООД Удостоверение № 543/18.10.2007 г. Заповед №РД 12- 62/29.12.2006 г.	500 г/кг флумиоксазин	8 г/дка	Слънчоглед, Царевица Срещу широколистни и някои житни плевели - внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата		-	3	
232.	ПОНТОС БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 1843-ПРЗ- 2/06.10.2021 г. Заповед №РД 11-1019 от 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2192 от 21.09.2021 г.	флуфенацет 240 г/л и пиколинафен 100 г/л	50-100 мл продукт/ дка	Зимна пшеница (мека и твърда), зимен ечемик, тритикале Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе-край на братенето. Видими са максимален брой братя) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка	П	-	втора професионална	
233.	ПРАЙМЪРИ МХ Шарда Кропкем С.Л., Испания Разрешение № 02113- ПРЗ-1/22.02.2024 г. Заповед №РД 11- 416/19.02.2024 г.	римсулфурон 30 г/кг + никосулфурон 120 г/кг + месотрион 360 г/кг	33 г продукт /дка	Царевица Срещу широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист - разтваряне на осми лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка	П		втора професионална	със системно действие
234.	ПРАКСИМ Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение №01719- ПРЗ-2/11.01.2024 г. Заповед №РД 11- 1014/28.05.2019 г. Заповед №РД11- 3052/28.12.2023 г.	метобромурон – 500 г/л	200-300 мл/продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе- развитие на хипокотила и котиледоните) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Дозата от 200 мл продукт/дка показва по- ниска ефикасност	П	-	втора професионална	със системно действие
			200-300 мл/продукт/ дка	Соя Срещу Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе- хипокотилът достига повърхността на	П	-		