			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Сем. Тиквови** Бяло гниене (*Sclerotinia* spp.) – внася се във фаза BBCH 10-88 (котиледоните се разтварят напълно-80% от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-		
			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Зелен фасул** Бяло гниене (*Sclerotinia* spp.) – внася се във фаза BBCH 10-89 (котиледоните са напълно разтворени-пълно узряване) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	-		
			Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ **ПОЛИВЕРСУМ** при минимални употреби				
195.	**ПЛЕНАРИС** Синджента България ЕООД Разрешение № 2057-ПРЗ-1/18.01.2023 г. Заповед № РД 11-2918/23.12.2022	оксатиапипролин - 200 г/л	125-175 мл продукт /100 кг семена (0.675 мл продукт/дка при сеитбена норма 7200 семена/дка)	**Слънчоглед** Срещу Мана *(Plasmopara halstedii)* – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Количеството продукт/дка и а.в./дка е изчислено при сеитбена норма 7200 семена/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
196.	**ПОЛИРАМ ДФ** БАСФ ЕООД **ОТНЕТО** Разрешение №0077-ПРЗ-3/09.10.2018 г. Заповед №РД 11-1918/28.09.2018 г.	метирам – 700 г/кг	0,2 %	**Лозя** Срещу Мана *(Plasmopara viticola)* – внася се във фаза BBCH 15-79 (пет листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка		28 дни	втора професионална	