			50 мл/дка	Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) първо третиране във фаза начало на цъфтеж до фаза тръбестите цветове във външната третина на питата са цъфнали (BBCH 61-63), второ третиране от фаза пълен цъфтеж до фаза цъфтежа преминава (BBCH 64-66) Брой мин/макс приложения – 2 Интеравал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
				Маслодайна рапица		28 дни		
			50 мл/дка	Фома (*Phoma lingam*) – внася се във фаза „розетка" (BBCH 13-14) Брой мин/макс приложения – 2 Интеравал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			50 мл/дка	Склеротиния по маслодайна рапица *(Sclerotinia sclerotiorum)*- внася се във фаза BBCH 61-67 Брой мин/макс приложения – 2 Интеравал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			50 мл/дка	Алтернария по маслодайна рапица (*Alternaria brassicae*) Брой мин/макс приложения – 2 Интеравал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
194.	**ПОЛИВЕРСУМ** БИОПРЕПАРАТИ, спол.с р.о, Чешка република Разрешение № 01898-ПРЗ-1/01.12.2020 г. Заповед №РД 11-2575 от 17.11.2020 г.	Pythium oligandrum M1 (≥ 1 x 10^6 ооспори на грам продукт)	50-100 л/дка	**Лозя (десертни и винени сортове)** Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) – внася се във фаза BBCH 68-89 (80% опадане на ресите-плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	-	непрофесионална	с несистемно действие Дозата на продукта и количест-вото вода се определят от

			10-30 г/дка	**Ягоди** Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) - BBCH 10-89 (начало на развитие на листа-плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	-	фенофа-зата и веге-тативната маса на расте-знията
			10-30 г/дка	**Листни зеленчуци, Пресни подправки** Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Бяло гниене (*Sclerotinia* spp.) – внася се във фаза BBCH 10-51 (развитие на листа-централният цветонос започва да нараства) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	-	
			10-30 г/дка	**Сем. Картофови (домати, пипер, патладжан)** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) – внася се във фаза BBCH 10-51 (развитие на листа-централният цветонос започва да нараства) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-	
			10-30 г/дка	**Сем. Тиквови (краставици, тиквички)** Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Брашнеста мана (*Sphaeroteca fusca*) – внася се във фаза BBCH 10-88 (котиледоните се разтварят напълно-80% от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-	

			10-30 г/дка	**Зелен фасул** Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) – внася се във фаза BBCH 10-89 (котиледоните са напълно разтворени-пълно узряване) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 7- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	-
			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Стъблени зеленчуци** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) – внася се във фаза BBCH 33-53 (удължаване на стъблото-30% от очакваната дължина на централното стъбло е достигната) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 7- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	-
			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Декоративни видове** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 6- 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-
			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Сем. Картофови** Бяло гниене (*Sclerotinia* spp.) – внася се във фаза BBCH 10-88 (пълно разтваряне на котиледоните-80% от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-

			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Сем. Тиквови** Бяло гниене (*Sclerotinia* spp.) – внася се във фаза BBCH 10-88 (котиледоните се разтварят напълно-80% от плодовете са с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-		
			10-30 г/дка	**Минимална употреба** **Зелен фасул** Бяло гниене (*Sclerotinia* spp.) – внася се във фаза BBCH 10-89 (котиледоните са напълно разтворени-пълно узряване) Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 5- 8 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка	П	-		
			Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ **ПОЛИВЕРСУМ** при минимални употреби				
195.	**ПЛЕНАРИС** Синджента България ЕООД Разрешение № 2057-ПРЗ-1/18.01.2023 г. Заповед № РД 11-2918/23.12.2022	оксатиапипролин - 200 г/л	125-175 мл продукт /100 кг семена (0.675 мл продукт/дка при сеитбена норма 7200 семена/дка)	**Слънчоглед** Срещу Мана *(Plasmopara halstedii)* – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Количеството продукт/дка и а.в./дка е изчислено при сеитбена норма 7200 семена/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
196.	**ПОЛИРАМ ДФ** БАСФ ЕООД **ОТНЕТО** Разрешение №0077-ПРЗ-3/09.10.2018 г. Заповед №РД 11-1918/28.09.2018 г.	метирам – 700 г/кг	0,2 %	**Лозя** Срещу Мана *(Plasmopara viticola)* – внася се във фаза BBCH 15-79 (пет листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка		28 дни	втора професионална	