

	Заповед №РД 11-2226/11.11.2019 г.		200 мл /продукт/ дка	Домати Срещу Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) - 1-во приложение- при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 6 Вода л/дка мин/макс - 40-150 л/дка Интервал между приложенията – 10	П	3 дни		
			300 мл /продукт/ дка	Цветни култури Срещу Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>rosae</i>) - 1-во приложение- при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 5 Вода л/дка мин/макс - 45-150 л/дка Интервал между приложенията – 10	П/З	-		
			1 л/дка (2 л/дка/ сезон)	Пшеница, тритикале, линец Срещу Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>) – внася се при поява на симптоми на болестта Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	35 дни		
			1 л/дка (2 л/дка/ сезон)	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i> , <i>Erysiphe graminis</i>) – внася се при поява на симптоми на болестта Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	35 дни		
			0,2 л/дка (1,2 л/дка/ сезон)	Патладжан Срещу Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) – внася се при поява на симптоми на болестта Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	3 дни		
202.	ПОСТ-ФИТ Биоверт С.Л, Испания Разрешение №01771-ПРЗ-1/15.11.2019 г. Заповед №РД11-2145/31.10.2019 г.	калиеви фосфонати (под формата на фосфонова киселина) - 250 г/л	700 – 1000 мл продукт/хл	Ябълки, круши Срещу запарване на плодовете при съхранение – внася се след прибиране Брой мин/макс приложения – 1 Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек	З	-	втора професионална	със системно действие

			700 – 1000 мл продукт/хл	Цитрусови култури (портокали, лимони, мандарини) Срещу Гниене на плодовете при съхранение (<i>Phytophthora</i> spp.) - – внася се след прибиране Брой мин/макс приложения – 1 Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек	3	-		
203.	ПОУДРИО ИСК Биосайансис Юръп Н.В, Белгия Разрешение № 01755-ПРЗ- 2/15.11.2019 г. Заповед №РД 11- 1718/20.08.2019 г.	пириофенон 400 г/л	Продуктът е идентичен на продукта за растителна защита КУСАБИ, разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01345 – ПРЗ, издание 4/15.10.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.			втора професионална	със системно действие	
204.	ПРАЙМ Синджента България ЕООД Разрешение №01787-ПРЗ- 1/31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 2585/16.12.2019 г.	фенпропидин - 750 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ЦЕЛСИВО с Разрешение № 01758-ПРЗ-1/22.10.2019 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			втора професионална	със системно действие	
205.	ПРАКТИС/ КОРНПРОТЕК Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01860-ПРЗ- 3/31.01.2023 г. Заповед №РД 11-1583 от 08.07.2020 г. Заповед № РД 11- 1614/15.07.2022 г. Заповед № РД 11-99- 18.01.2023 г.	протиоконазол – 250 г/л	80 мл/дка	Пшеница Срещу Ръжди (<i>Puccinia</i> spp.) – внася се във фаза 1-во приложение ВВСН 31-33 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - третият възел е най-малко на 2 см над втория възел) 2-ро приложение ВВСН 39-49 (фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима - видими първи осили) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10- 14 дни	П	35 дни	втора професионална	
			80 мл/дка	Пшеница Срещу Фузариози по класовете (<i>Fusarium</i> spp.) – внася се във фаза 1- во приложение ВВСН 39 - 43 (фаза на флаговия лист - средна фаза на вретене: влагалището на флаговия лист е едва видимо подуто)	П	35 дни		