

			700 – 1000 мл продукт/хл	Цитрусови култури (портокали, лимони, мандарини) Срещу Гниене на плодовете при съхранение (<i>Phytophthora</i> spp.) - – внася се след прибиране Брой мин/макс приложения – 1 Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек	3	-		
201.	ПОУДРИО ИСК Биосайансис Юръп Н.В, Белгия Разрешение № 01755-ПРЗ- 2/15.11.2019 г. Заповед №РД 11- 1718/20.08.2019 г.	пириофенон 400 г/л	Продуктът е идентичен на продукта за растителна защита КУСАБИ, разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01345 – ПРЗ, издание 4/15.10.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.			втора професионална	със системно действие	
202.	ПРАЙМ Синджента България ЕООД Разрешение №01787-ПРЗ- 1/31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 2585/16.12.2019 г.	фенпропидин - 750 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ЦЕЛСИВО с Разрешение № 01758-ПРЗ-1/22.10.2019 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			втора професионална	със системно действие	
203.	ПРАКТИС/ КОРНПРОТЕК Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01860-ПРЗ- 3/31.01.2023 г. Заповед №РД 11-1583 от 08.07.2020 г. Заповед № РД 11- 1614/15.07.2022 г. Заповед № РД 11-99- 18.01.2023 г.	протиоконазол – 250 г/л	80 мл/дка	Пшеница Срещу Ръжди (<i>Puccinia</i> spp.) – внася се във фаза 1-во приложение ВВСН 31-33 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - третият възел е най-малко на 2 см над втория възел) 2-ро приложение ВВСН 39-49 (фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима - видими първи осили) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10- 14 дни	П	35 дни	втора професионална	
			80 мл/дка	Пшеница Срещу Фузариози по класовете (<i>Fusarium</i> spp.) – внася се във фаза 1- во приложение ВВСН 39 - 43 (фаза на флаговия лист - средна фаза на вретене: влагалището на флаговия лист е едва видимо подуто)	П	35 дни		

139.	КУСАБИ Ай Ес Кей Биосайънсис Юрп, Белгия Разрешение № 01345 – ПРЗ-3/15.05.2018 г. Заповед №РД 11-1652/06.11.2015 г., Заповед №РД 11-620/19.04.2016 г. Заповед №РД 11-702/19.04.2018 г. Заповед №РД 11-1980/09.10.2018 г. Заповед № РД 11-94 от 12.01.2021 г.	пириофенон – 300 г/л	30 мл/ дка	Лозя Брашнеста мана (оидиум) (<i>Oidium tuckeri</i>) – внася се до ВВСН85: омекване на зърната Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията мин/макс - 14 Вода л/дка мин/макс – 30 мл/дка		28 дни	втора професионална	
140.	КУСТОДИЯ Адама Агрикулчър БВ Разрешение № 01439 – ПРЗ-2/01.04.2019 г. Заповед №РД 11-1559/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-575/19.03.2019 г.	азоксистробин 120 г/л тебуконазол 200 г/л	80-125 мл/дка	Ечемик(зимен и пролетен) Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> spp.), Ръжда (<i>Puccinia</i> spp.), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>) – внася се във фаза ВВСН 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяване-то) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка		Ечемик(зимен и пролетен), Пшеница, тритикале - 35; Лозя(винени сортове), Лук, чесън – 21; Краставици, Тиквички, Домати, Патладжан – 3; Пъпеши – 7	втора професионална	
			80-125 мл/дка	Пшеница, Тритикале Брашнеста мана (<i>Erysiphe</i> spp.), Ръжда (<i>Puccinia</i> spp.), Листни петна (<i>Septoria</i> spp.) - ВВСН 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-21 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка				
			100-125 мл/дка	Пшеница, Тритикале Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> spp.) - ВВСН 30 – 69 (начало на удължаване				