

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                          |                 |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                        | начало на цъфтеж: видими първи пращници)<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията – 21<br>Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка                                                                                                                                                                                                |   |                                                          |                 |  |
| 310. | <b>ФЛИНТ МАКС 75 ВГ</b><br>Байер България ЕООД<br>Разрешение № 0599-ПРЗ-3/20.12.2017 г.<br><a href="#">Заповеди №: РД 09-456/10.07.2007 г.</a><br><a href="#">РД 12-4/03.01.2008 г.</a> ;<br><a href="#">РД 12-65/13.06.2008 г.</a> ;<br><a href="#">РД 12-26/30.04.2009 г.</a><br>Заповед №РД 11-2614/01.12.2017 г. | 500 г/кг<br><a href="#">тебуконазол</a> +<br>250<br><a href="#">трифлуксизтроб</a><br><a href="#">ин</a> | 0,016 %<br>(16 г/дка)  | <b>Лозя</b><br>Оидиум по лоза ( <i>Oidium tuckeri</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | ябълки, грозде -14;<br><br>череша - 7;<br>краставици -3; | непрофесионална |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 0,02 %<br>(20 г/дка)   | <b>Ябълка</b><br>Струпяване ( <i>Venturia inaequalis</i> )<br>Брашнеста мана ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                          |                 |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 20 г/дка               | <b>Краставици</b><br>Брашнеста мана ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                          |                 |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 30 г/дка               | <b>Череша</b><br>Бяла ръжда ( <i>Blumeriella jaapii</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                          |                 |  |
| 311. | <b>ФЛОСУЛ/ ПОУСИС</b><br>Сулфур Милс Лимитед<br>Франция САС, Франция<br><b>Разрешение № 1789-ПРЗ-3</b><br>Заповед №РД 11-2632/17.12.2019 г.<br>Заповед №РД 11-2142/29.09.2022 г.<br><b>Заповед №РД 11-</b>                                                                                                           | <a href="#">сяра</a> – 800 г/л                                                                           | 400<br>мл продукт/ дка | <b>Лозя (винени и десертни сортове)</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Uncinula necator</i> ( <i>Oidium tuckeri</i> )) – внася се във фаза ВВСН 15-18 (пет листа са отворени-8 листа са отворени)<br>Брой мин/макс приложения – 8<br>Интервал между приложенията – 7<br>Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка<br>До 3,2 л/дка/ за вегетационен период | П | 5 дни                                                    | непрофесионална |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 200<br>мл продукт/ дка | <b>Домати, патладжан</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Leveillula taurica</i> ) – внася се във фаза първи симптоми на болестта<br>ВВСН 10-89 (пълно разтваряне на котиledonите-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 6<br>Интервал между приложенията –10<br>Вода л/дка мин/макс - 40-150 л/дка<br>До 1,2 л/дка/ за вегетационен период    | П | 3 дни                                                    |                 |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 300<br>мл продукт/ дка  | <b>Рози</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Podosphaera pannosa</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89<br>Брой мин/макс приложения – 5<br>Интервал между приложенията –10<br>Вода л/дка мин/макс - 40-150 л/дка<br>До 1,5 л/дка/ за вегетационен период                                                      | П | -      |
| 1000<br>мл продукт/ дка | <b>Зърнено-житни култури</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Blumeria graminis</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (първи лист на колеоптила-пълна зрелост)<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията –14<br>Вода л/дка мин/макс - 15-30 л/дка<br>До 2 л/дка/ за вегетационен период | П | 35 дни |
| 500<br>мл продукт/ дка  | <b>Праскови, нектарини, кайсии</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ) – Първо приложение от ВВСН 69 (край на цъфтеж)<br>Брой мин/макс приложения – 3<br>Интервал между приложенията –7<br>Вода л/дка мин/макс - 15-30 л/дка<br>До 1,5 л/дка/ за вегетационен период                                      | П | 3 дни  |
| 750<br>мл продукт/ дка  | <b>Семкови овощни видове</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ) – Първо приложение от ВВСН 60 (отворени първи цветове)<br>Брой мин/макс приложения – 9<br>Интервал между приложенията –7<br>Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка<br>До 6,75 л/дка/ за вегетационен период                                  | П | 3 дни  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 750<br>мл продукт/ дка | <b>Захарно и кърмно цвекло</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Erysiphe betae</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта<br>ВВСН 10-89 (видими първите листа-пълна зрелост)<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията –15<br>Вода л/дка мин/макс - 20 – 60 л/дка<br>До 1,5 л/дка/ за вегетационен период                                                                      | П | 3 дни |
| 750<br>мл продукт/ дка | <b>Тиквички</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> syn. <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиledonите се разтварят напълно-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 3<br>Интервал между приложенията –7<br>Вода л/дка мин/макс – 10 л/дка<br>До 2,25 л/дка/ за вегетационен период                                     | П | 3 дни |
| 750<br>мл продукт/ дка | <b>Краставици и тиквови култури с ядлива кора</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> syn. <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта<br>ВВСН 10-89 (котиledonите се разтварят напълно-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 6<br>Интервал между приложенията –7<br>Вода л/дка мин/макс – 10 л/дка<br>До 4,5 л/дка/ за вегетационен период | П | 3 дни |
| 500<br>мл продукт/ дка | <b>Тикви и тиквови култури с неядлива кора</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> syn. <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта<br>ВВСН 10-89 (котиledonите се разтварят напълно-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 8<br>Интервал между приложенията –7<br>Вода л/дка мин/макс – 10 л/дка                                            | П | 3 дни |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|                        | До 4 л/дка/ за вегетационен период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| 750<br>мл продукт/ дка | <b>Пъпеш</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> syn. <i>Erysiphe cichoracearum</i> )<br>– внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиledonите се разтварят напълно-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 5<br>Интервал между приложенията – 7<br>Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка<br>До 3,75 л/дка/ за вегетационен период | П | 3 дни |
| 500<br>мл продукт/ дка | <b>Сладък и лют пипер</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Leveillula taurica</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (пълно разтваряне на котиledonите-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 6<br>Интервал между приложенията – 10<br>Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка<br>До 3 л/дка/ за вегетационен период                                     | П | 3 дни |
| 750<br>мл продукт/ дка | <b>Грах без шушулки</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Erysiphe pisi</i> )<br>– внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (вижда се двойка обвивни листа-пълна зрялост)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка                                                                                                                      | П | 3 дни |

|      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 750<br>мл продукт/ дка | <b>Марули и салатни култури</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> syn. <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ) – внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните напълно развити-пълно узряване)<br>Брой мин/макс приложения –4<br>Интервал между приложенията - 15<br>Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка<br>До 3 л/дка/ за вегетационен период | П | 3 дни  |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 750<br>мл продукт/ дка | <b>Ягоди</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Sphaerotheca macularis</i> syn. <i>Podosphaera macularis</i> , <i>Podosphaera aphanis</i> ) – Първо приложение от ВВСН 60 (първи отворени цветове)<br>Брой мин/макс приложения –8<br>Интервал между приложенията - 9<br>Вода л/дка мин/макс –20-60 л/дка<br>До 6 л/дка/ за вегетационен период                                         | П | 3 дни  |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 312. | <b>ФЛОУЕТ 80 ВГ</b><br>ШАРДА ЕВРОПА б.в.б.а.,<br>Белгия                                                                                         | Второ търговско име на ФОЛОУ 80 ВГ                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 313. | <b>МЕДЕЙРО Ф ВГ</b><br>АСЦЕНЗА АГРО<br>С.А.,Португалия<br>Разрешение № 01967-ПРЗ-<br>1/20.07.2021 г.<br>Заповед №РД 11-1589 от<br>12.07.2021 г. | <a href="#">фосетил-<br/>алуминий</a> – 500<br>г/кг<br><a href="#">фолпет</a> – 250 г/кг | 400 г/дка              | <b>Лозя (винени сортове)</b><br>Срещу Мана ( <i>Plasmopara viticola</i> ) –<br>внася се до ВВСН 83 (зърната<br>формират цвят)<br>Брой мин/макс приложения – 1-3<br>Интервал между приложенията – 10-14<br>дни<br>Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка<br>Да не се консуми-рат листа от лози,<br>третира-ни с продукта                                                               | П | 28 дни | втора<br>професионална | с комбинирано<br>действие<br>(системно и<br>несистемно)<br><br>Употребата на<br>този продукт и<br>други продукти<br>за растителна<br>защита<br>употребявани<br>при лозя,<br>съдържащи<br>фосетил-<br>алуминий,<br>калиеви<br>фосфонати, |
|      |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 400 г/дка              | <b>Лозя (десертни сортове)</b><br>Срещу Мана ( <i>Plasmopara viticola</i> ) –<br>внася се до ВВСН 69 (край на<br>цъфтежа)<br>Брой мин/макс приложения – 1-3<br>Интервал между приложенията – 10-14<br>дни                                                                                                                                                                        | П | -      |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |