

				Не повече от 1 приложение на култура При балур (<i>Sorghum halepense</i>) от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка + 150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка Срещу многогодишни житни плевели				
233	ПИТОН 75 ВДГ Зенит Кроп сайансис България ЕООД	Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ						
234	ПЛЕДЖ 50 ВП Суммит Агро България ЕООД Удостоверение № 543/18.10.2007 г. Заповед №РД 12- 62/29.12.2006 г.	500 г/кг флумиоксазин	8 г/дка	Слънчоглед, Царевича Срещу широколистни и някои житни плевели - внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата		-	3	
235	ПОНТОС БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 1843-ПРЗ- 2/06.10.2021 г. Заповед №РД 11-1019 от 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2192 от 21.09.2021 г.	флуфенацет 240 г/л и пиколинафен 100 г/л	50-100 мл продукт/ дка	Зимна пшеница (мека и твърда), зимен ечемик, тритикале Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе-край на братенето. Видими са максимален брой братя) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка	П	-	втора професионална	
236	ПРАЙМЪРИ МХ Шарда Кропкем С.Л., Испания Разрешение № 02113- ПРЗ-1/22.02.2024 г. Заповед №РД 11- 416/19.02.2024 г.	римсулфурон 30 г/кг + никосулфурон 120 г/кг + месотрион 360 г/кг	33 г продукт/ дка	Царевича Срещу широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист - разтваряне на осми лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка	П		втора професионална	със системно действие
237	ПРАКСИМ Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение №01719- ПРЗ-2/11.01.2024 г. Заповед №РД 11- 1014/28.05.2019 г. Заповед №РД 11- 3052/28.12.2023 г.	метобромурон – 500 г/л	200-300 мл/продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе- развитие на хипокотила и котиледоните) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Дозата от 200 мл продукт/дка показва по- ниска ефикасност	П	-	втора професионална	със системно действие

			200-300 мл/продукт/ дка	Соя Срещу Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе- хипокотилът достига повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Дозата от 200 мл продукт/дка показва по- ниска ефикасност	П	-		
238.	ПРИНЦИПАЛ Кортева Агрисайънс България ЕООД Удостоверение № 01109- ПРЗ/02.11.2010 г. Заповед РД 12- 79/19.10.2010 г. Заповед №РД 11-2514 от 06.11.2020 г. Заповед №РД 11-1127 от 01.06.2021 г.	429 г/кг никосулфурон + 107 г/кг римсулфурон	9 г/дка+ Тренд 90 – 0,1 %	Царевича за зърно и силаж (фураж) Срещу едногодишни житни и много- годишни житни (в т.ч. балур от коренища) и някои широколистни плевели внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15-25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели Количество на работния разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения: 1		-	3	
239.	ПРЕМАЗОР СД Глобахем НВ, Белгия Разрешение № 01550- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Заповед № РД 11- 139/18.01.2018 г. Заповед №РД 11-2 от 02.01.2020 г.	дифлуфеникан - 500 г/л	25 мл/дка	Пшеница (зимна) Срещу едногодишни широколистни плевели- внася се до до ВВСН 29 Край на братенето Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-	втора професионална	
			37,5 мл/дка	Пшеница (пролетна) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза До ВВСН 29 Край на братенето Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-		
			25 мл/дка	Ечемик (зимен) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се до ВВСН 29 Край на братенето Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-		