

			83-100 мл/дка	Тиквови с неядлива кора (пъпеш) Срещу Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-3 Вода л/дка мин/макс – 20 - 100 л/дка Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни		3 дни		
			83-100мл/дка	Лук, чесън и шалот Срещу Мана (<i>Peronospora destructor</i>) - ВВСН 13-89 трети лист (>3см) ясно видим - пълно узряване: семената черни и твърди) Брой мин/макс приложения – 1-3 Вода л/дка мин/макс – 20 - 100 л/дка Интервал между приложенията мин. – 8-10 дни		3 дни		
206.	ПРЕМИС БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01415 – ПРЗ-3/10.08.2023 г. Заповед №РД 11-951/31.05.2016 г. Заповед №РД 11-568/27.03.2018 г. Заповед №РД 11-982/23.05.2019 г. Заповед №РД 11-1854/07.08.2023 г.	Тритиконазол - 25 г/л	100-150 мл/ 100 кг семена	Пшеница Твърда главня по пшеницата (<i>Tilletia caries</i>) внася се във фаза ВВСН 00 Сухо семе		-	втора професионална	
			100-150 мл/ 100 кг семена	Ечемик Праховита главня по ечемика (<i>Ustilago nuda</i>) внася се във фаза ВВСН 00 Сухо семе				
207.	ПРИАКСОР ЕК БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01513 – ПРЗ-2/19.01.2022 г. Заповед №РД 11-2121/19.10.2017 г. Заповед №РД 11-203 от 24.01.2019 г. Заповед №РД 11-3178 от 31.12.2021 г.	Флуксапироксад - 75 г/л Пиракlostробин - 150 г/л	50-100 мл/дка	Пшеница (зимна, пролетна, твърда), спелта, тритикале Срещу Брашнеста мана <i>Erysiphe (Blumeria) graminis</i>), Септориози (<i>Septoria spp.</i>), Ръжди (<i>Puccinia spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-69 (забележими 5 братя-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои пращници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения – 2	-	35 дни	втора професионална	Със системно действие