

94. **ИНПУТ/ ПРОЗАРО ПЛЮС**

Байер България ЕООД
Разрешение №01839-ПРЗ-
3/11.03.2022 г.
Заповед № РД 11-781 от
26.03.2020 г.
Заповед №РД 11-1591 от
12.07.2021 г.
Заповед №РД 11-229 от
17.02.2022 г.

[спироксамин](#) -
300 г/л
[протиоконазол](#) -
160 г/л

60-100 мл/дка	Пшеница Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recognita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни
125 мл/дка	Пшеница Срещу Фузариоза по класа (<i>Fusarium spp</i>) Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>) Петносване по класа (<i>Leptosphaeria nodorum</i>) Жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Базично гниене (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни
60-100 мл/дка	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe hordei</i>) Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни
125 мл/дка	Ечемик Срещу Фузариоза по класа (<i>Fusarium spp</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>) Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 1	П	-

втора
професионална

със системно
действие

	Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка		
60-100 мл/дка	Ръж Срещу Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) – внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни
125 мл/дка	Ръж Срещу Фузариоза по класа (<i>Fusarium spp</i>) Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-
125 мл продукт/ дка	Овес Срещу Листни петна (септориоза) (<i>Septoria spp.</i>); Коронеста ръжда (<i>Puccinia coronata</i>);Фузариоза по класа (<i>Fusarium spp.</i>); Брашнеста мана (<i>Erysiphe avena</i>);Петносване по класа (<i>Leptosphaeria nodorum</i>); Базично гниене (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>);Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>) – внася се във фаза BBCH 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни

60-100 мл/дка	Тритикале Срещу Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe tritici</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни
125 мл/дка	Тритикале Срещу Листни петна (септориоза) (<i>Septoria spp</i>) Фузариоза по класа (<i>Fusarium spp</i>) Петносване по класа (<i>Leptosphaera nodorum</i>) Базично гниене (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-
60-100 мл/дка	Спелта Срещу Септориоза (<i>Septoria spp</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recognita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни
125 мл продукт/ дка	Спелта Срещу Фузариоза по класа (<i>Fusarium spp</i>) Фузарийно кореново гниене (<i>Fusarium spp</i>) Петносване по класа (<i>Leptosphaeria nodorum</i>) Жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) Базично гниене (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	42 дни

			125 мл продукт/ дка	Минимална употреба Семенпроизводство на житни култури в т.ч. фуражни и житни треви Срещу комплекс от патогени вкл. Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа; всички класчета са завършили цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от използването на ИНПУТ за разрешените минимални употреби, съгласно Приложение 2 на настоящата заповед. Отговорността за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от използването на ИНПУТ за разрешените минимални употреби, съгласно Приложение 2 на настоящата заповед, е на лицето, употребяващо продукта.	П	-		
95.	ИНСИГНИЯ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01996-ПРЗ-1/11.01.2022 г. Заповед № РД 11-3166 от 30.12.2021 г.	пираклостробин - 200 г/кг	50-100 г продукт /дка	Царевица Срещу Северен листен пригор (<i>Setosphaeria turcica</i>), листна ръжда (<i>Puccinia sorghi</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-65 (поява на първи възел - <i>мъжки цветове</i> : метлицата е цъфнала по цялата си дължина; <i>женски цветове</i> : косата е напълно развита) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	Със системно действие При спазване на Закона за пчеларството
			50-100 г продукт /дка	Царевица Срещу Дребни листни петна (<i>Kabatiella zeae</i>) хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus carbonum</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-65 (поява на първи възел - <i>мъжки цветове</i> : метлицата е цъфнала по цялата си дължина, <i>женски цветове</i> : косата е напълно развита) Брой мин/макс приложения – 1	П			