

				край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения - 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 10-40 мл/дка				
181.	ОРИУС 5 ФС НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия	Второ търговско име на СЕЙВИДЖ 5 ФС						
182.	ОРИУС 6 ФС ЛИРОТЕКТОР 6 ФС НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия Разрешение № 01100-ПРЗ-4/17.11.2023 г. Заповед №РД 11-1853/09.12.2015 г. Заповед №РД 11-2142/23.10.2018 г. Заповед №РД 11-981 от 13.05.2020 г. Заповед №РД 11-2590/07.11.2023 г.	тебуконазол 60 г/л	50 мл/ 100кг семена	Пшеница Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Твърда главня (<i>Tilletia levis</i> , <i>syn. Tilletia foetida</i>) и (<i>Tilletia caries</i> , <i>syn. Tilletia tritici</i>), Праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>) Сеитбена норма максимум до 25 кг семена /дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			50 мл/ 100кг семена	Ечемик Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Кафява праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>) Сеитбена норма максимум до 25 кг семена /дка				
183.	ОРИУС 25 ЕВ /ДИНАСТИ 25ЕВ /ТЕБУМАКС 25 ЕВ НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия Удостоверение № 01099-ПРЗ-4/27.06.2014 г. Заповед №РД 09-665/09.12.2004 г. Заповед №РД 11 – 1659/29.12.2011 г. Заповед № РД 11-208/27.02.2012 г. Заповед №РД 11-530/03.05.2012 г. Заповед №РД 11-862/20.06.2014 г.	тебуконазол - 250 г/л	0,04 %	Лоза Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i> , <i>Uncinula necator</i>) (40 мл/дка)		Лоза -35 дни; маслодай на рапица-56 дни роза- не се изисква	3	
			50 мл/дка 50-70 мл/дка	Маслодайна рапица Сухо стъблено гниене Склеротийно гниене				
			80 мл/дка	Роза (маслодайна и декоративна) Ръжда Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Черни листни петна (<i>Diplocarpon rosae</i>) Да не се използва за рози, предназначени за производство на хранителни продукти				