

225.	РЕВИКЕАР БАСФ ЕООД Разрешение № 01911-ПРЗ-2/20.12.2021 г. Заповед № РД 11-98 от 12.01.2021 г. Заповед №РД 11-2956 от 09.12.2021 г.	мефентрифлукон азол - 100 г/л пираклостробин - 100 г/л	75-100 мл продукт/дка	Пшеница (зимна, пролетна, твърда), спелта, тритикале Срещу Кафява ръжда (<i>Puccinia triticiana</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Ран листен пригор (<i>Zymoseptoria tritici</i> /= <i>Septoria tritici</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	35 дни	втора професионална	с комбинирано действие Максимален брой третираня за култура, за един вегетационен период – 2
			75-100 мл продукт/дка	Пшеница (зимна, пролетна, твърда), спелта, тритикале Срещу Фузариоза (<i>Fusarium sp</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		14 дни		
			75-100 мл продукт/дка	Ечемик (зимен и пролетен) Срещу Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), Рамулария/листни петна (<i>Ramularia collo-cygni</i>), Ринхоспориоза/ Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	35 дни		

75-100 мл продукт/дка	Спелта Тритикале Срещу Кафява ръжда (<i>Puccinia triticiana</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Ран листен пригор (<i>Zymoseptoria tritici</i> /=Septoria tritici) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	
75-100 мл продукт/дка	Ръж Срещу Ринхоспориоза/ Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	35 дни
50 мл продукт/дка	Минимална употреба Ечемик (зимен и пролетен) Срещу Ринхоспориоза/ Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	35 дни
75-100 мл продукт/дка	Спелта, Тритикале Срещу Фузариоза (<i>Fusarium sp</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2	П	14 дни

				Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка				
			50 мл продукт/дка	Минимална употреба Ръж Срещу Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhynchosporium secalis), кафява ръжда (Puccinia recondita) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита РЕВИКЕАР при минимални употреби. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита РЕВИКЕАР за контрол при минимални употреби.	П	35 дни		
226.	РЕВИОНА БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 02000-ПРЗ-1/10.03.2022 г. Заповед №РД 11-227 от 17.02.2022 г.	мефентрифлукон азол – 75 г/л	130 мл/1000 м² LWA/ПВЛМ* Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е	Ябълки, круши Срещу Струпясване по ябълка (<i>Venturia inaequalis</i>), струпясване по круша (<i>Venturia pyrina</i>), брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>), кафяви листни петна (<i>Alternaria mali</i>) – внася се във фаза ВВСН 53-85 (разпукване на пъпките - напреднало	П	28 дни	втора професионална	със системно действие При спазване на Закона за пчеларството LWA (Leaf Wall