

232.	РЕДИГО М Байер България ЕООД Разрешение №01723-ПРЗ-1/19.06.2019 г. Заповед №РД 11-1038/03.06.2019 г.	протиоконазол – 100 г/л + металаксил – 20 г/л	15 мл/50 000 семена (при сеитбена норма от 10 000 семена/дка, макс. 3 мл продукт/дка)	Царевица Срещу Комплекс почвени патогени – <i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 0.1-1.9 л/100 кг семена	П	-	първа професионална
			15 мл/50 000 семена (при сеитбена норма от 10 000 семена/дка, макс. 3 мл продукт/дка)	Минимални употреби Сладка царевица Срещу Комплекс почвени патогени – <i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 0.1-1.9 л/100 кг семена Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита РЕДИГО М за контрол на Комплекс почвени патогени – <i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> при сладка царевица. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на РЕДИГО М за контрол на Комплекс почвени патогени – <i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> при сладка царевица е на лицето прилагашо продукта.	П	-	
233.	РЕДИГО ПРО 170 ФС Байер България ЕООД Разрешение № 01431 –ПРЗ-1/03.08.2016 г. Заповед №РД 11-1298/19.07.2016 г. Заповед №РД 11-2071/22.10.2018 г. Заповед №РД 11-1966 от 25.08.2020 г.	протиоконазол – 150 г/л тебуконазол – 20 г/л	50 мл/100 кгсемена 66,7 мл/100 кгсемена	Пшеница Твърда главня (<i>Tilletia tritici</i>), праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>) Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>), Снежна плесен (<i>Microdochium nivale</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Броймин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 200-400 мл/ 100 кг семена		-	първа професионална
				Ечемик – зимен и пролетен Праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>)			

			50 мл/100 кгсемена 66,7 мл/100 кгсемена	Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium</i> spp.), Хелминтоспориозно кореново гниене (<i>Cochliobolus sativus</i>), Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>) - първична инфекция, Ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>)				
			66,7 мл/100 кгсемена	Ечемик – зимен Снежна плесен (<i>Microdochium nivale</i>)				
			66,7 мл/100 кгсемена	Ръж и тритикале Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium</i> spp.), Снежна плесен (<i>Microdochium nivale</i>)				
			66,7 мл/100 кгсемена	Овес Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium</i> spp.), Петносване на пониците (<i>Pyrenophora avenae</i>) – първична инфекция				
234.	РЕСИВИ Синджента България ЕООД Разрешение № 01997-ПРЗ-1/11.01.2022 г. Заповед № РД 11-3167 от 30.12.2021 г.	ацибензолар-S-метил - 375 г/л	10 мл/SU* (10 мл/150 000 семена)	Слънчоглед Срещу Мана (<i>Plasmopara halstedii</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Работен р-р мл/брои семена - 150-450 мл/SU SU – единица семена, равна на 150 000 семена *0,5 мл продукт/дка *0,133 л продукт/100 кг семена	П	-	втора професионална	със системно действие
235.	РЕЛЕНИЯ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 2063-ПРЗ-1/31.01.2023 г. Заповед № РД 11-122-19.01.2023	мефентрифлукон азол – 50 г/л	25 мл/дка 100 мл/100 кг семена (при сеитбена норма от 25 кг/дка)	Зърнено-житни култури Пшеница (зимна, твърда), спелта, лимец, двузърнест лимец) Срещу Вджуджаваща главня (<i>Tilletia controversa</i>), обикновена (твърда, мазна) главня (<i>Tilletia caries</i> (syn. <i>Tilletia tritici</i>)) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Да се използва неразреден или разреден с вода при максимално съотношение продукт:вода - 1:7 Макси-мална сеитбена норма 25	3		втора професионална	със системно действие