				кг/дка. Третираните семена да не се използват за храна или фуражни цели				
236.	**РЕТЕНГО 20 ЕК /КОМЕТ ПРО** БАСФ ЕООД Разрешение № 01230–ПРЗ-5/06.10.2021 г. Заповед №РД 11-605/19.04.2016 г. Заповед №РД 11-2017/20.10.2016 г. Заповед №РД 11-143/18.01.2018 г. Заповед №РД 11-204 от 24.01.2019 г. Заповед №РД 11-2193 от 21.09.2021 г. Заповед №РД11-1353/07.06.2023 г.	пираклостробин – 200 г/л	70-100 мл/дка	**Царевица** Северен листен пригор (*Helminthosporium turcicum*) Листна ръжда (*Puccinia sorghi*) Внася се във фаза BBCH 30-65 (от начало на удължаване на стъблото до масов цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода - 10 – 40 л/дка		Царевица - не се изисква Слънчоглед, соя – 21 дни; фасул, грах, нахут -28 дни	втора професионална	
			100 мл/дка	**Слънчоглед** Фома *(Phoma macdonaldii),* Фомопсис*(Diaporthe helianthi),* Склеротийно увяхване *(Sclerotinia sclerotiorum),* Алтернариоза *(Alternaria helianthi)*Брашнеста мана*(Erysiphe cichoracearum)* Физиологични ефекти Внася се във фаза BBCH 16-75 шести лист – семената от средната третина на питата са сиви и са достигнали окончателния си размер Брой мин/макс приложения – 1 Вода - 10 – 40 л/дка Може да се прилага превантивно в доза 50 мл/дка				
			50-100 мл/ дка	**Минимална употреба** **Соя** Сухо склероцийно гниене (*Sclerotium bataticola*), Пригор по стъблата на бобовите (Diaporthe phaseolorum), Аскохитоза (*Ascochyta sojaecola*) – внася се във фаза BBCH 59-79 (Виждат се първите венчелистчета до почти всички шушулки са достигнали крайна дължина) Брой мин/макс приложения – 1 Вода - 10 – 40 л/дка				
			50 мл/ дка	**Минимална употреба** **Фасул** Сиво гниене (Botrytis cinerea),				

				Склероцийно гниене (Sclerotinia spp.), Ръжда (Uromyces spp.)- внася се във фаза BBCH 59-79 (Първите листа на цвета се виждат до чушки) Брой мин/макс приложения – 1 Вода - 10 – 40 л/дка				
			50 мл/ дка	**Минимална употреба** **Грах** Листни петна (Ascochyta pisi), Ръжда (Uromyces pisi) – внася се във фаза BBCH 59-79 (Виждат се първите венчелистчета до шушулките са достигнали типичен размер) Брой мин/макс приложения – 1 Вода - 10 – 40 л/дка				
			50 мл/ дка	**Минимална употреба** **Нахут** Чернилка (*Mycosphaerella rabiei*), Аскохитоза (*Ascochyta sojaecola*) – внася се във фаза BBCH 59-79 (Виждат се първите венчелистчета до шушулките са достигнали типичен размер) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 10 – 40 л/дка				
237.	**РИВАЛ** Агрия АД, България Разрешение № 01520-ПРЗ-2/01.04.2019 г. Заповед №РД 11-2173/25.10.2017 г. Заповед №РД 11-179/22.01.2019 г. Заповед №РД 11-592/ 19.03.2019 г.	пропамокарб хидрохлорид - 722 г/л	300мл/ продукт/ $м^3$	**Домати** Срещу Сечене на разсада (*Phytophtora* spp.; *Pythium* spp.) - внася се преди засяване/ засаждане Инкорпориране в почвата/субстрата Вода л/дка Мин/макс - 10-20 л/$м^3$ При домати продуктът се прилага 1 път чрез инкорпориране или до 3 пъти чрез поливане Брой Мин/макс приложения - 1		-	втора професионална	