

	Заповед №РД 11-1926 от 23.08.2021 г.			Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
240.	РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ Синджента България ЕООД Разрешение № 01236–ПРЗ-3/14.03.2019 г. Заповед №РД 11-457/28.03.2014 г. Заповед №РД 11-288/08.02.2017 г. Заповед №РД 11-2150 от 23.10.2018 г. Заповед №РД 11-439/27.02.2019 г.	металаксил- М – 20 г/кг меден оксихлорид – 141.9 г/кг	500 г/дка	Броколи Мана (<i>Peronospora spp.</i>) и Чернилка (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		20 дни	непрофесионална	
			500 г/дка;	Домати Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		3 дни		
			500 г/дка	Картофи Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		14 дни		
			500 г/дка	Карфиол Мана (<i>Peronospora spp.</i>) и Чернилка (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		20 дни		
			500 г/дка	Лоза Мана (<i>Plasmopara viticola syn. Peronospora viticola</i>) - при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		20 дни		
			481 г/дка	Пресни билки и босилек на открито и в оранжерии		10 дни		

	Мана (<i>Phytophthora spp.</i>), алтернариоза /черни листни петна (<i>Alternaria spp.</i>) - при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		
500 г/дка	Салата, маруля, на открито и в оранжерии Мана по салата (<i>Bremia lactucae</i>), алтернариоза/ черни листни петна (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се във фаза При поява на болестта ВВСН 18-43 (растежа продължава до 8 или повече същински разтворени листа-образувана 30 % от листната маса, характерна за сортът) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		10 дни
500 г/дка	Рукола и зеле Мана (<i>Peronospora spp.</i>) и чернилка (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се във фаза При поява на болестта ВВСН 18-43 (растежа продължава до 8 или повече същински разтворени листа-образувана 30 % от листната маса, характерна за сортът (или 30 % от очаквания размер на главата е достигнат - при зеле) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		10 дни
500 г/дка	Цикория, кресон, полска салата и червен синап Мана по салата (<i>Bremia lactucae</i>), алтернариоза/ черни листни петна (<i>Alternaria spp.</i>) - При поява на болестта ВВСН 18-43 (растежа продължава до 8 или повече същински разтворени листа-		10 дни

			образувана 30 % от листната маса, характерна за вариетета) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка			
	500 г/дка	Лук Мана по лук (<i>Peronospora spp.</i>), пурпурни петна по лук (<i>Alternaria spp.</i>) – при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка			14 дни	
	500 г/дка	Дини и пъпеши Мана по пъпеши (<i>Pseudoperonospora spp.</i>), кафяви листни петна (<i>Alternaria spp.</i>) - при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка			3 дни	
	500 г/дка	Босилек Срещу Мана (<i>Phytophthora spp.</i>), черни листни петна (алтернариоза) (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка			10 дни	
	481 г/дка	Минимална употреба Босилек Срещу Мана (<i>Phytophthora spp.</i>), черни листни петна (алтернариоза) (<i>Alternaria spp.</i>) – внася се при поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка			28 дни	
	481 г/дка	Минимална употреба Пресни билки (магданоз, листа от целина, машерка, градински чай) Срещу Мана (<i>Phytophthora spp.</i>),			28 дни	

				черни листни петна (алтернариоза) (<i>Alternaria</i> spp.) – внася се При поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			40 мл/дка	Лозя Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)				
241.	РОКСАМ 75 ВГ Суми Агро България ЕООД	Второ търговско име на ЕЛЕКТИС 75 ВГ						
242.	САВИАЛ ПОСТ Лаинко С.А, Испания Разрешение № 01768-ПРЗ-1/15.11.2019 г. Заповед №РД11-2176/04.11.2019 г	732,8 г/л (еквивалентно на 250 г/л фосфонова киселина)	700 – 1000 мл продукт/хл	Ябълки, круши Запарване на плодовете при съхранение – внася се след прибиране Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек Брой мин/макс приложения - 1	3	-	втора професионална	със системно действие
			700 – 1000 мл продукт/хл	Цитрусови култури (портокали, лимони, мандарини) Гниене на плодовете при съхранение (<i>Phytophthora</i> spp.) – внася се след прибиране Брой мин/макс приложения - 1 Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек	3	-		
243.	САВИАЛ ФОРТЕ Лаинко, С.А., Испания Разрешение №01783-ПРЗ-2/30.06.2023 г. Заповед №РД11-2176 от 04.11.2019 г Заповед № РД11-1351/07.06.2023 г.	калиеви фосфонати - 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)	250 мл продукт/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се след ВВСН 20 (9 и повече листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	15 дни	непрофесионална	със системно действие
			150-875мл продукт/дка	Портокали, Грейпфрути Срещу Фитофторно гниене (<i>Phytophthora</i> sp.) – внася се след ВВСН 40 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 20 Вода л/дка мин/макс – 100-350 л/дка	П	15 дни		
			45-250 мл продукт/ дка	Домати Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза ВВСН	О	15 дни		