

				черни листни петна (алтернариоза) (<i>Alternaria</i> spp.) – внася се При поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			40 мл/дка	Лозя Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)				
240.	РОКСАМ 75 ВГ Суми Агро България ЕООД	Второ търговско име на ЕЛЕКТИС 75 ВГ						
241.	САВИАЛ ПОСТ Лаинко С.А, Испания Разрешение № 01768-ПРЗ-1/15.11.2019 г. Заповед №РД11-2176/04.11.2019 г	732,8 г/л (еквивалентно на 250 г/л фосфонова киселина)	700 – 1000 мл продукт/хл	Ябълки, круши Запарване на плодовете при съхранение – внася се след прибиране Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек Брой мин/макс приложения - 1	3	-	втора професионална	със системно действие
			700 – 1000 мл продукт/хл	Цитрусови култури (портокали, лимони, мандарини) Гниене на плодовете при съхранение (<i>Phytophthora</i> spp.) – внася се след прибиране Брой мин/макс приложения - 1 Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек	3	-		
242.	САВИАЛ ФОРТЕ Лаинко, С.А., Испания Разрешение №01783-ПРЗ-2/30.06.2023 г. Заповед №РД11-2176 от 04.11.2019 г Заповед № РД11-1351/07.06.2023 г.	калиеви фосфонати - 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)	250 мл продукт/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се след ВВСН 20 (9 и повече листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	15 дни	непрофесионална	със системно действие
			150-875мл продукт/дка	Портокали, Грейпфрути Срещу Фитофторно гниене (<i>Phytophthora</i> sp.) – внася се след ВВСН 40 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 20 Вода л/дка мин/макс – 100-350 л/дка	П	15 дни		
			45-250 мл продукт/ дка	Домати Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза ВВСН	О	15 дни		