			100-150 г/дка	**Минимална употреба** **Декоративни и цветни култури** Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Брашнеста мана (*Podosphaerapannosa*)				
			100-150 г/дка	**Минимална употреба** **Нахут** Аскохитоза (*Mycosphaerell rabiei*), Бяло гниене (*Sclerotinia spp.*) – внася се във фаза ВВСН 15-69				
248.	**СЕЛТИМА** БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01850-ПРЗ-1/26.06.2020 г. Заповед №РД 11-1330 от 23.06.2020 г. Заповед №РД 11-3046 от 14.12.2021 г.	пираклостробин - 100 г/л	100 мл продукт /дка	**Ориз** Срещу Припламване (чалгън) по ориза *(Pyricularia (Magnaporthe) oryzae),* Хелминтоспориоза *(Helminthosporium oryzae (Cochliobolus miyabeanus)* - ВВСН 39-65 (фаза на флагелния лист: флагелният лист разтворен, ушичките и лигулата на флагелния лист и предпослдния лист подредени в права линия - пълен цъфтеж: видими прашници върху повечето класчета) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10-21 дни Вода л/дка мин/макс приложения – 20-40 л/дка При ниска степен на нападение и при растителна покривка между 60 и 75 % за първо третиране дозата да се намали на 75 мл/дка.	П	-	втора професионална	
249.	**СИВАР** Лаинко С.А., Испания Разрешение №01604-ПРЗ-2/30.06.2023 г. Заповед №РД 11-1261/12.07.2018 г. Заповед №РД 11-2619 от 24.11.2020 г.	азоксистробин - 250 г/л	80мл/продукт/дка	**Краставици, корнишони, тиквички** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) – внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс – 1-3 Интервал межу приложенията (мин) – 10 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка	-	1 ден	втора професионална	със системно действие

Заповед №РД11-1409/09.06.2023 г.		80мл/продукт/дка	**Пъпеши, тикви, дини** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) – внася се във фаза BBCH 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс – 1-3 Интервал между приложенията (мин) – 10 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка	-	3 дни
		80-100 мл/продукт/дка	**Домати** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза BBCH 51-89 (първо съцветие изправена китка,първа цветна пъпка-пълна зрялост) Брой мин/макс – 1-2 Интервал между приложенията (мин) – 10 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка	-	3 дни
		100мл/продукт/дка	**Пшеница (зимна и пролетна)** Срещу Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*), ръжда (*Puccinia* spp.), листни петна (септориоза) (*Septoria tritici*), фузариоза (*Fusarium* spp.) - BBCH 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка		35
		100 мл/продукт/дка	**Ечемик (зимен и пролетен)** Срещу Брашнеста мана (*Erysiphe graminis*), ръжда (*Puccinia* spp.), листен пригор (*Rhynchosporium secalis*), хелминтоспориоза (*Helminthosporium* spp.) – внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-крй на изкласяванет: класът напълно се е показал от		35 дни

	влагалището на флаговия лист) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка		
100 мл/ продукт/дка	**Ориз** Срещу пирикулариоза (Pyricularia oryzae), хелминтоспориоза (*Helminthosporium* spp.) – внася се на пролет BBCH 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восъчна зрелост (твърда консистенция) Брой мин/макс – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка		28 дни
50 мл продукт /дка	**Картофи** Срещу Алтернария (*Alternaria solani*) – внася се във фаза BBCH 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 mm) от първото съцветие (главно стъбло) - плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	7 дни
80-100 мл продукт /дка	**Зрял грах, зелен грах (зърна), зелен грах (шушулки)** Срещу Аскохитоза (Ascochyta pisi), ръжда (Uromyces pisi) – внася се във фаза BBCH 17-72 (7 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 7 мустачета - 20 % от шушулките са достигнали типична дължина)	П	35 дни

	Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка		
80-100 мл продукт /дка	**Бакла** Срещу Аскохитоза (Ascochyta fabae), Ръжда (Uromyces sp.) – внася се във фаза BBCH 20-79 (няма странични разклонения - почти всички бобове са достигнали крайна дължина) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка	П	35 дни
80-100 мл продукт /дка	**Зелен фасул** Срещу Аскохитоза (*Ascochyta fabae*), Ръжда (*Uromyces* sp.*)* – внася се във фаза BBCH 20-79 (начало на формиране на странични разклонения - чушки: отделни фасулиеви зърна се виждат лесно) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка	П	14 дни
100 мл продукт /дка	**Маслодайна рапица** Алтернария (Alternaria sp.) – внася се във фаза BBCH 60-67 (10 % от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос - прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	21 дни
80-100 мл продукт /дка	**Пипер** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза BBCH 51-89 (първо съцветие, изправена пъпка - пълна зрялост)	О	3 дни

	Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-0 л/дка		
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Райска ябълка** Срещу Mycosphaerella nawae внася се във фаза BBCH 60-69 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	-
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Артишок** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) внася се във фаза BBCH 41-55 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	7 дни
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Броколи** Срещу Мана (*Peronospora parasitica*) – внася се във фаза BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	14 дни
80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Карфиол** Срещу Мана (*Peronospora parasitica*) – внася се във фаза BBCH 41-48 (главите на карфиола започват формиране - 80% от очаквания диаметър е достигнат) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	14 дни
80-100	**Минимална употреба**	О	3 дни

			мл продукт /дка	**Патладжан** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза BBCH 51-89 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка				
			80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква)** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) – внася се във фаза BBCH 51-89 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка	П	3 дни		
			80-100 мл продукт /дка	**Минимална употреба** **Маруля, полска салата, ескариол (широколистна ендевия), кресон, земен кресон, аругула (рукола), червен синап, листа и стъбла от род Brassica, включително от ряпа** Срещу Мана (*Bremia lactucae*) – внася се във фаза BBCH 41-48 Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **СИВАР** за вредител или група вредители, с които се води борба от **Приложение № 2**. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита	П	7 дни		

				СИВАР за контрол на за вредител или група вредители, с които се води борба от **Приложение № 2** е на лицето, прилагащо продукта.				
250.	**СИВАР ГОЛД** Лаинко С.А., Испания Разрешение № 02088-ПРЗ-1/14.07.2023 г. Заповед № РД11-1625/06.07.2023 г.	калиеви фосфонати - 255 г/л + азоксистробин - 62,5 г/л	300 мл продукт/дка	**Домати, патладжан** Срещу Картофена мана (*Phytophthora infestans*) – внася се във фаза първи същински лист на основното стъбло – пълна зрялост (BBCH 11-89) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Последно приложение до средата на юли	О/П	-		със системно действие
			300 мл продукт/дка	**Картофи** Срещу Мана (*Phytophthora infestans*) – внася се във фаза Разтваряне на първите листа на главното стъбло, повече от 4 см – плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват (BBCH 11-89) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	15 дни		
			300 мл продукт/дка	**Лозя (винени и десертни сортове)** Срещу Мана (*Plasmopara viticola*) – внася се във фаза съцветията се виждат изцяло (BBCH 53) до прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	15 дни		
			300 мл продукт/дка	**Праскови, нектарини** Срещу Фитофторно гниене (*Phytophthora* sp.) – 1-во приложение-есен (BBCH 91-92); 2-ро приложение-пролет (BBCH 60-69); 3-то приложение-лято Преди прибиране на реколтата съобразено с	П	15 дни		