

	Синджента България ЕООД							
266.	СИРТАКИ Оксон Италия С.п.А Разрешение № 01449 – ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед №РД 11- 1712/14.09.2016 г. Заповед №РД 11-1229 от 27.06.2019 г. Заповед №РД 11-518 от 11.03.2021 г.	кломазон - 360 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:	П	-	втора професионална	
			25-30 мл/дка	Картофи След сеитба преди поникване ВВСН 01-08 (начало на покълване: поява на кълнове (< 1 mm) – стъблата нарастват към почвената повърхност) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			30-50 мл/дка	Ориз (засят на сухо) След сеитба преди поникване ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето – поява на колептила) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			30-50 мл/дка	Ориз (засят във вода) Преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			30-50 мл/дка	Ориз (засят във вода) Рано след поникване ВВСН 12-14 (две листа разтворени – четири листа разтворени) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			40-50 мл/дка	Тютюн След разсаждане (до 2-4 дни след разсаждане) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка Третирането да се локализи-ра в редовете на културата				
			30-40 мл/дка	Соя След сеитба, преди поникване ВВСН 01-08 (начало на набъбване на семето – хипокотила достига повърхността на почвата: вижда се извивката на хипокотила) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				

			30 мл/дка	Соя Преди поникване ВВСН 01-08 (започване на набъбване – показване на хипокотила с котиледоните над почвената повърхност) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			33 мл/дка	Зимна маслодайна рапица Преди поникване ВВСН 01-08 (започване на набъбване – показване на хипокотила с котиледоните над почвената повърхност) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			5 мл/дка	Захарно цвекло Рано след поникване ВВСН 12-18 (разлистени 2 листа-разлистени 8 листа) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 6 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			Първо трети-ране – 5 мл/дка Второ трети- ране – 5 мл/дка Трето трети- ране –10 мл/дка	Захарно цвекло Рано след поникване ВВСН 12-18 (разлистени 2 листа-разлистени 8 листа) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 6 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
267.	СУОРД 240 ЕК НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ, Австрия Разрешение № 01211 – ПРЗ-4/17.05.2023 г. Заповед №РД 11- 108/29.01.2014 г. Заповед №РД 11- 381/01.03.2018 г. Заповед РД 11-1518 от 31.07.2019 г.	240 г/л клодинафоп- пропаргил		При пшеница (във фенофаза ВВСН 13 – 29 (от трети лист до край на братенето на културата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс- 20-40 л/дка		-	втора професионална	
			17мл/дка	Срещу полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) и див овес (<i>Avena spp.</i>)				
			20мл/дка	Срещу тръстичина (<i>Phalaris spp.</i>), пролетно просо (<i>Milium vernale</i>)				
			25мл/дка	Срещу райграс и житна пиявица (<i>Lolium spp.</i>)				