				продукт или разреден с вода до съотношение максимално 1:10				
			100 мл продукт /100 кг семена	**Минимална употреба** **Памук** Срещу Ризоктония *(Rhizoctonia solani),* фузариоза (*Fusarium* sp.) – внася се във фаза ВВСН 00 (Сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Неразреден продукт или разреден с вода до съотношение максимално 1:10 Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита СИСТИВА 333 ФС за контрол на ризоктония *(Rhizoctonia solani)* и фузариоза (*Fusarium* sp.) при памук. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита КОРАГЕН 20 СК/ВОЛИАМ за контрол на СИСТИВА 333 ФС за контрол на ризоктония *(Rhizoctonia solani)* и фузариоза (*Fusarium* sp.) при памук е на лицето, прилагащо продукта.				
258.	**СКАБ 480 СК** Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01998-ПРЗ-1/19.01.2022 г. Заповед №РД 11-3171 от 31.12.2021 г.	каптан - 480 г/л	300 мл продукт/дка	**Ябълки, круши** Срещу Струпясване (*Venturia spp.*) – внася се във фаза от ВВСН 51 (набъбване на неразцъфналите пъпки) м. април Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	П	21дни	втора професионална	С несистемно действие При спазване на Закона за пчеларството

259.	**СКАБ 80 ВГ/ КАПЕТАН/ КАПШЪН** Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01336-ПРЗ-9/22.11.2023 г. Заповед №РД 11-1245/17.07.2015 г. Заповед №РД 11-632/19.04.2016 г., Заповед №РД 11-1301/19.07.2016 г., Заповед №РД 11-2022/20.10.2016 г., Заповед №РД 11-2404/05.12.2016 г. Заповед №РД 11-1523/31.07.2019 г. Заповед №РД 11-634 от 31.03.2022 г. Заповед №РД11-1402/09.06.2023 г. Заповед № РД11-2582/07.11.2023 г.	каптан - 800 г/кг	188 г/ дка	**Ябълки, круши** Срещу Струпясване (*Venturia spp.*) Антракноза (*Gleosporium spp.*) Късно кафяво гниене по плодовете (*Monilia fructigena*) Нектриален рак (*Nectria galligena*) *(Stemphylium vesicarium) – само по круша* – внася се от фаза BBCH 51 (Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци) Брой мин/макс приложения – 1-7 Интервал между приложенията- 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г. продукт/дка, Съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	21 дни	втора професионална	с несистемно действие
			188 г/дка	**Минимална употреба** **Дюли, мушмули, круши-Наши** Срещу Късно кафяво гниене (*Monilinia fructigena*) – внася се във фаза от BBCH 51: Набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци Брой мин/макс приложения -7 Интервал между приложенията- 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 Максималното количество продукт на култура за вегетационен перод е 1316 г. продукт/дка, съответно 1052,8 г. каптан/дка	П	21 дни		
				Минимална употреба **Дюли, мушмули, круши-Наши** Срещу Струпясване (*Venturia sp.*), Антракноза (*Gleosporium sp.*), Кафяво гниене (*Monilia sp.*), Сиви петна (*Mycosphaerella sp.*) – внася се във фаза BBCH 99-50 (продукцията е прибрана -набъбване на неразцъфналите пъпки)				