

277.	СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис България ЕООД Разрешение № 0600-4/03.07.2018 г. Заповед №РД 11-1177/03.07.2018 г. Заповед №РД 11-2636/17.12.2019 г. Заповед №РД 11-1927 от 23.08.2021 г.	феноксапроп-п-етил - 75 г/л	100 мл продукт/ дка	Пшеница и ечемик Срещу житни плевели - внася се от фаза ВВСН 10-32 (първи лист от колеоптила-втория възел е най-малко на 2 см над първия възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 200-400 л/дка	П	-	втора професионална	
278.	СМЕРЧ 24 ЕК АГРИЯ АД, Република България Разрешение № 0374-ПРЗ-3/22.10.2019 г. Заповед №РД 11-2040 от 14.10.2019 г.	240 г/л оксифлуорфен	62,5 мл продукт/ дка	Слънчоглед Срещу широколистни плевели и кокоше просо (<i>Echinochloa crus-galli</i>) – внася се След сеитба, преди поникване (преди 30-ти април) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 30-60 л/дка Насочено пръскане в редовете на културата, ширина на лентата на третиране от 28 до 36 см при междуредово разстояние от 76 см.	П	-	втора професионална	с контактно действие
			62,5 мл продукт/ дка	Лозя Срещу широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00 (покой) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка				
			62,5 мл продукт/ дка	Семкови овощни видове Срещу широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели– внася се във фаза ВВСН 00 (покой) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка				