

			3 мл/дка + 50 мл/дка адювант	Минимална употреба Горскодървесни видове Листозавивачки - сем. <i>Tortricidae</i> , Педомерки – сем. <i>Geometridae</i> , Златозадка – <i>Euproctis chysorrhoea</i> L, гъботворка – <i>Lymantria dispar</i> L Борова процесия – <i>Thametopoea pityocampa</i> Schiff Обикновена борова листна оса – <i>Diprion pini</i> L. Ръждива борова листна оса – <i>Neodiprion sertifer</i> Geoffr.		-		
			Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на Синеис 480 СК при минимални употреби. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на продукта при минимални употреби Продукта да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед.					
135.	СКАТО Гован Италия С.р.л., Италия Разрешение № 01238-ПР3-3/10.02.2023 г. Заповед №РД 11-851/20.06.2014г. Заповед №РД 11-1038/03.07.2014г. Заповед №РД 11-2610/01.12.2017 г. Заповед № РД 11-2515 от 06.11.2020 г. Заповед № РД 11-110-18.01.2023 г.	25г/л делтаметрин	30- 50мл/дка	Домати, патладжан Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), Памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), листни въшки от род <i>Aphis</i> spp., Картофена листна въшка (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>) – внася се при поява на неприятеля. Листни въшки (ВВСН 40);памукова ношенка-начало на цъфтеж-30% от плодовете са с типичен цвят на зреење (ВВСН 50-83) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 60-100 л/дка работен разтвор		домати, патладжан, марули, артишок – 3 дни	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите
			30- 50 мл/дка	Артишок Молци по артишока (<i>Depressaria erinaceella</i> и <i>Gortyna xanthenes</i>),Египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>) – внася се при поява на неприятеля.Четвърти лист- загиване на листата (ВВСН 14-49) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка работен разтвор				
			25- 50 мл/дка	Марули Листни въшки по салатата (<i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i>), Зелена прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>), ношенки от род (<i>Helicoverpa</i> spp.), Египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>) и Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>) – внася се при поява на неприятеля. Разтворен пети същински лист- образувана е 80% от листната маса (ВВСН 15-48) Брой мин/макс приложения – 1-3 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка работен разтвор				
136.	СОЙЛГАРД 1.5 ГР Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01859-ПР3-1/10.07.2020 г. Заповед №РД 11-1582 от 08.07.2020 г.	тефлутрин - 15 г/кг	1,22 кг/дка	Царевича Срещу Телени червеи (<i>Agriotes</i> sp.), Западен коренов царевичен червей (<i>Diabrotica virgifera</i>) – внася се по време на сеитба Брой мин/макс приложения – 1 91,5 г продукт / 100 линейни метра (междуредие от 75 см)	П	-	втора професионална	
137.	СУМИ АЛФА 5 ЕК / СУМИЦИДИН 5 ЕК/ ОАЗИС 5 ЕК Сумитомо Кемикал Агро Юрп С.А.С., Франция Разрешение № 0157-ПР3-4/10.04.2017 Заповед № РД 09-869/19.12.2003 г.	50 г/л есфенвалерат (esfenvalerate)	0,02%	Ябълков плодов червей (<i>Laspeyresia pomonella</i>); Източен плодов червей (<i>Laspeyresia molesta</i>); Кръгломинираш молец (<i>Cemiosoma scitella</i>); Листни въшки по хризантема; зелена Прасковена листна въшка по пипер в оранжерии (<i>Myzodes persicae</i>); Памукова листна въшка по краставици в оранжерии (<i>Aphis gossypii</i>); Листозавивачки и педомерки по овощни; Червена пъпкозавивачка (<i>Tmetocera ocellana</i>); Малка зимна педомерка (<i>Operophtera brumata</i>); Сива пъпкозавивачка (<i>Argeroploce variagana</i>); Анарзия по кайсия (<i>Anarsia lineatella</i>); черна Сливов плодова оса (<i>Hoplocampa minuta</i>); Сливов плодов червей (<i>Laspeyresia finebrana</i>) през вегетацията		14 дни	втора професионална	с несистемно действие
			0,025%	Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) през вегетацията		14 дни		
			0,03%	Крушова листна бълха (<i>Psylla pyri</i>);		14 дни		