

				употребата на продукта при сорго и при ориз срещу едногодишни житни и широколистни плевели е на лицето, прилагащо продукта.				
282.	СТРЕЧ Зенит Кроп Сайънсис, България ЕООД Разрешение №01763- ПРЗ-1/22.10.2019 г. Заповед №РД 11- 2061/17.10.2019 г.	никосулфурон - 40 г/л	150 мл продукт /дка	Царевина Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтворен осми лист) Брой приложения мин/макс 1 Вода л/дка мин/макс - 40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
283.	СТРАТОС УЛТРА БАСФ ЕООД - България	Второ търговско име на ФОКУС УЛТРА						
284.	СУВЕРЕН ОД Аспенза Агро С.А., Португалия Разрешение №01556-ПРЗ- 2/17.05.2023 г. Заповед №РД 11- 363/28.02.2018 г. Заповед №РД 11-1026 от 20.05.2020 г. Заповед №РД 11- 1025/04.05.2023	никосулфурон - 20 г/л сулкотрион -150 г/л	Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели 200 мл продукт /дка	Царевина Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист - разтваряне на девети лист). Брой приложения мин/макс 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			100 мл продукт /дка	Царевина Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист - разтваряне на девети лист). Брой приложения мин/макс 2 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
285.	СУЛКОГАН 300 СК НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия Разрешение № 01228–ПРЗ- 3/11.01.2024 г. Заповед №РД 11- 2149/23.10.2018 г. Заповед №РД 11- 3049/28.12.2023 г.	сулкотрион – 300 г/л	100 -150 мл/дка	Царевина Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза фаза на царевичката 2-6 лист (ВВСН 12-16) ; фаза на житните плевели 1-4 лист (ВВСН 11-14) ; фаза на широколистните плевели 2-6 лист (ВВСН 12-23) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка		-	1	със системно действие

286.	СУЛКОТРЕК Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01574- ПРЗ-2/15.11.2021 г. Заповед №РД 11- 459/15.03.2018 г. Заповед №РД 11-2676 от 10.11.2021 г.	сулкотрион - 173 г/л тербутилазин - 327 г/л	200-250 мл/дка	Царевича Срещу житни и широколистни плевели – внося се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семе - поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)) или ВВСН 10-16 (поява на първи лист - разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	Да не се използва при сладка царевича
287.	СУЛТАН 500 СК /БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган Холдинг Б.В. Удостоверение № 01067- 4/28.11.2013 г. Заповед №РД 12- 42/10.09.2004 г. Заповед №РД 12-26/05.03.2010 г. Заповед №РД 11- 845/05.08.2013г. Заповед №РД 11- 1178/05.11.2013г.	500 г/л метазахлор	200 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу едногодишни широколистни плевели - внося се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ		70 дни	1	
288.	СЪКСЕСЪР ТХ ФМС Агро България ЕООД Разрешение №01537- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Заповед №РД 11- 137/18.01.2018 г. Заповед №РД 11- 1631/20.08.2018 г. Заповед №РД 11-1153 от 20.06.2019 г. Заповед №РД 11-2673 от 10.11.2021 г.	петоксамид 300 г/л тербутилазин 187,5 г/л	300-400 мл/дка	Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели Внося се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семе-поникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внося се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист) Брой мин/макс приложения – едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ Вода л/дка – 20-50 л/дка	П	-	втора професионална	Да не се прилага при сладка царевича и царевича за семеизпроизводст во