

				специфичното за сорта оцветяване) С изключение на периода на цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка				
			96 г/дка	Рози всички видове и сортове, разсадници и градини Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) внася се при поява		-		
			96 г/дка	Декоративна растителност (дървета и храсти) (разсадници и гори): Гъбни болести <i>Botrytis</i> sp. (BOTRSP) внася се при поява		-		
			80 г/дка	Семеноизводство на етерични култури, билки, подправки за храна и нехранителни за парфюмерийната промишленост, сушени билки за чай, мак Бяло гниене (<i>Sclerotinia</i> spp.); Сухо стъблено гниене (<i>Phoma</i> spp.) внася се във фаза BBCH 51-89 Начало на оформяне на цвета до начало на презряване на плодовете		-		
276.	СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР АДАМА Агрикалчър Б. В., Нидерландия Удостоверение №01159-2/28.11.2012 г. Заповед №РД 11-3175 от 31.12.2021 г. Заповед № РД 11-1608/15.07.2022 г.	113 г/кг диметоморф + 600 г/кг фолпет	1,8 кг/ха (180 г/дка)	Мана по лозата (винени сортове) Картофената мана по доматите (полско производство)		лозя – 28 дни домати – 7 дни	първа професионална	
277.	СЯРА ВГ Агрошулн ГмбХ, Германия Разрешение № 01475-ПРЗ-2/13.09.2018 г. Заповед №РД 11-842/24.04.2017 г. Заповед №РД 11-1737/29.08.2018 г.	сяра - 800 г/кг	600 г /дка	Ябълки, Круши Срещу Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>): внася се при благоприятни условия за развитие на болестта. Преди цъфтеж, при поява на зелени и розови пъпки Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>): внася се след цъфтеж, при опадване на венчелистчетата Брой приложения мин/макс – 8	П	-	непрофесионална	