

	растителна защита ТАЛИЗМА УЛ , в съответствие с Разрешение № 01480- ПРЗ-Издание: 2/09.06.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.							
141.	ТАЛИЗМА ЕК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл Разрешение № 01388 – ПРЗ-1/ 25.03.2016 г. Заповед №РД 11- 395/16.03.2016 г. Заповед №РД 11- 2365/22.11.2018 г. Заповед №РД РД11- 2726/16.11.2023 г.	диперметриц - 80 г/л	10 – 20 мл/ тон зърно	Пшеница Ечемик , Ръж, Овес, Тритикале, Лимец, Царевича, Ориз- (съхранявани в складове) Складови неприятели, Житна гърица (<i>Sitophilus granarium</i>), Оризова гърица (<i>S. orizae</i>), Зърнов бръмбар (<i>Rhyzopertha dominica</i>), Ръждиво-червен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), Брашнен бръмбар (<i>T. confusum</i>), Суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), Зърнояд (<i>Cyprotestes ferrugineus</i>), Зърнов молец (<i>Sitotroga cerealate</i>), Молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), Брашнест акар (<i>Acarus siro</i>), Плесен акар (<i>Tyrophagus putrescentiae</i>) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 0,1-2,5 литра на тон зърно Да не се допуска попадане на продукта върху транспортната лента	3	Зърно – 1 ден; Срока на повторно влизане в третирания склад - 48 часа	първа професионална	
			30-60 мл/100 м ² площ	Празни складови помещения: Насекоми и акари при съхраняване на зърно Пълзящи насекоми Вода л/дка мин/макс - 3.3 – 5.0 литра/ 100 м ² площ				
142.	ТЕКФОС ТАБЛЕТА Делиция Фрайберг ГмбХ/ Федерална република Германия Разрешение № 01817- ПРЗ-1/06.03.2020 г. Заповед №РД 11-532 от 21.02.2020 г.	алуминиев фосфид - 560 г/кг	3-5 таблети/м ³ (=3-5 г РН ₂ /м ³)	Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephesia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephesia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашнен акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> - по време на транспорт Брой мин/макс приложения - 1	3	Шамфъсътк – 35 дни; ядки -21 дни; продукти от зърнено-житни култури – 14 дни; всички останали – 7 дни	първа професионална	21 дневна експозиция

			5-10 таблетки/ м³ (=5-10 г РН ₃ /м³)	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се преди складиране Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
			5-10 таблетки/ м³ (=5-10 г РН ₃ /м³)	Тютюн при съхранение Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се при съхранение Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
			5-10 таблетки/ м³ (=5-10 г РН ₃ /м³)	При съхранение на - продукти от зърнено-житни, изсушени плодове и зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се при съхранение Брой мин/макс приложения - 1	3			Между 5-14 дни експози-ция

143.	ТЕКФОС ПЕЛЕТА Делиция Фрайберг ГмбХ/ Федерална република Германия Разрешение № 01816- ПРЗ-1/06.03.2020 г. Заповед №РД 11-531 от 21.02.2020 г.	алуминиев фосфид - 560 г/кг	15-25 пелети/м ³ (=3-5 г РН ₃ /м ³)	Зърно при транзитен корабен транспорт Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се по време на транспорт Брой мин/макс приложения – 1	3	Шамфъсътък – 35 дни; ядки -21 дни; продукти от зърнено-житни култури – 14 дни, всички останали – 7 дни	първа професионална	21 дневна експози-ция
			25-50 пелети/м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се преди складиране Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
			25-50 пелети/м ³ (=5-10 г РН ₃ /м ³)	Тютюн при съхранение Срещу Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашнен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждивочервен зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), трогодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), тютюнев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), тютюнев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), трогодерма (<i>Trogoderma glabrum</i>), брашнен бръмбар (<i>Tenebrio sp.</i>), брашмян акар (<i>Acarus siro</i>), хлебен бръмбар (<i>Stegobium paniceum</i>) и <i>Tyroglyphus sp</i> – внася се при съхранение Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 5-14 дни експози-ция