| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299. | **ТЕМЗА 480 СК/ ОСОРНО 480 СК**<br>Глобахем Н.В, Белгия<br>Разрешение № 02017-ПРЗ-2/18.10.2022 г.<br>Заповед №РД 11-640 от 31.03.2022 г.<br>Заповед №РД11-2152/30.09.2022 г. | месотрион – 480 г/л | 30 мл/дка | **Царевица за сърно и фураж**<br>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели. Внася се преди поникване на културата BBCH 00-08 (сухо семе - поява на колеоптила) или след поникване на културата BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)<br>Ранни фази от развитието на плевелите | П | - | втора професионална | Продуктът да не се прилага при сладка царевица и при царевица за семепроизводство. |
| 300. | **ТЕНДЪР ЕК**<br>Синджента България ЕООД | **Второ търговско име на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК** | | | | | | |
| 301. | **ТЕНУРОН 75 ВГ**<br>Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия | **Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ** | | | | | | |
| 302. | **ТЕРИДОКС 500 ЕК**<br>Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария Разрешение № 01096-ПРЗ-3/01.04.2019 г.<br>Заповед № РД 11-2389/26.11.2018 г.<br>Заповед №РД 11-547/15.03.2019 г. | 500 г/л диметахлор | 200 мл продукт/дка | **Зимна маслодайна рапица**<br>Срещу Едногодишни широколистни и някои житни плевели – внася се във фаза Преди и до поникване<br>BBCH 00-14 (сухо семе-растежа продължава до разтворен четвърти лист)<br>есен<br>Брой мин/макс приложения - 1 път на 3 години<br>Вода л/дка мин/макс - 8-40 л/дка<br>Разрешава се употребата в максимално допустимо количество от 100 г а.в. /дка единствено за всяка трета година за една и съща обработваема площ.<br>При евентуален провал на културата могат да бъдат засявани единствено рапица или зърнени култури съгласно резултатите от проведените изследвания с последващи култури. | | - | непрофесионална | |