

308.	ТЕФЛИКС ГР Глобахем Н. В., Белгия Разрешение № 02008- ПРЗ-1/14.04.2022 г. Заповед № РД 11-563 от 28.03.2022 г.	тефлутрин – 15 г/кг	0,7 кг/дка	Царевина Срещу Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се преди сеитба Брой мин/макс приложения - 1	П	-	втора професионална	
			над 0,7-1,2 кг продукт/дка	Царевина Срещу Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се преди сеитба Брой мин/макс приложения – 1 Едно приложение на всеки 2 години на една и съща площ	П			
			0,7 кг/дка	Слънчоглед Срещу Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се преди сеитба Брой мин/макс приложения – 1	П			
			над 0,7-1,0 кг продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Телени червеи (<i>Agriotes sp.</i>) – внася се преди сеитба Брой мин/макс приложения – 1 Едно приложение на всеки 2 години на една и съща площ	П			
309.	ТИДЕКС Екслузивас Сарабия С.А., Испания Разрешение № 01880- ПРЗ-1/04.09.2020 г. Заповед №РД 11-1992 от 27.08.2020 г.	флуроксипир 200 г/л	100 мл продукт/дка	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен-ечемик, тритикале, ръж, овес) Срещу широколистни плевели (след понижаване) – внася се във фаза ВВСН 12- 39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	със системно действие
			100 мл продукт/дка	Царевина Срещу широколистни плевели (след понижаване) – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-растежа продължава до разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П			

			150 мл продукт/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза пролет-есен Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	15 дни		
			100 мл продукт/дка	Тревни площи Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 20-26 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
310.	ТИТУС 25 ДФ Кортева Агрисайънс България ЕООД Удостоверение № 0571- ПРЗ-1/14.10.2008 г. Протоколи № 36 от 1991 г., 45 от 1999 г., 47 от 2001 г. на Министерство на земеделието и горите и Протокол № 3/2002 г. на Експертната токсикологична комисия по пестициди при НЦХМЕХ. Заповед № РД 11- 1615/15.07.2022 г.	римсулфурон - 250 г/кг	4-6 г/дка 5 г/дка	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и балур от коренища Царевица и картофи Домати Забележка: Да не се използва при картофи сорт „Бинте”.		30 дни	3	
311.	ТОЛУЗО Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01913- ПРЗ-2/14.07.2023 г. Заповед №РД 11-127 от 19.01.2021 г. Заповед №РД11- 1660/10.07.2023	метобромурон – 400 г/л кломазон - 24 г/л	200 - 300 мл/дка	Картофи Срещу широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-09 (период на покой, клубените не покълват – поникване: стъблата излизат над почвената повърхност) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка – 15-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
312.	ТОМИГАН XL Адама Агрикалчър БВ, Нидерландия, Разрешение № 01930- ПРЗ-1/30.03.2021 г.	флорасулам – 2,5 г/л флуороксипир - 100 г/л	100-150 мл/дка	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, ръж, тритикале, овес) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 21-37	П	-	втора професионална	със системно действие