

				Брой мин/макс приложения – 1 Едно приложение на всеки 2 години на една и съща площ				
306.	ТИДЕКС Ексклузивас Сарабия С.А., Испания Разрешение № 01880- ПРЗ-1/04.09.2020 г. Заповед №РД 11-1992 от 27.08.2020 г.	флуроксипир 200 г/л	100 мл продукт/дка	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен-ечемик, тритикале, ръж, овес) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	със системно действие
			100 мл продукт/дка	Царевича Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-растежа продължава до разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
			150 мл продукт/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза пролет-есен Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	15 дни		
			100 мл продукт/дка	Тревни площи Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 20-26 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
307.	ТИТУС 25 ДФ Кортева Агрисайънс България ЕООД Удостоверение № 0571- ПРЗ-1/14.10.2008 г. Протоколи № 36 от 1991 г., 45 от 1999 г., 47 от 2001 г. на Министерство	римсулфурон - 250 г/кг	4-6 г/дка 5 г/дка	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и балур от коренища Царевича и картофи Домати Забележка: Да не се използва при картофи сорт „Бинте”.		30 дни	3	