

			дка	<i>grisea</i>), Хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus miyabeanus</i>) – внася се във фаза ВВСН 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восьчна зрелост (твърда консистенция), превантивно, при поява на първи симптоми Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка				
303.	ТУИНГО Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение №01606-ПРЗ-3/02.10.2023 г. Заповед №РД 11-1258/12.07.2018 г. Заповед №РД 11-1939 от 21.08.2020 г. Заповед №РД 11-1155 от 02.06.2021 г. Заповед №РД 11-2150/20.09.2023 г.	симоксанил - 40 г/кг фолпет - 334 г/кг	300 г/дка	Лозя (винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-83 (отворени втори листа-зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс - 20-100 л/дка	-	28 дни	втора професионална	с комбинирано (системно и несистемно) действие
			300 г/дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-69 (отворени втори листа-край на пъфтежа) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс - 20-100 л/дка	-	70 дни		
304.	ТРУНФО МАКС/ ТРЕЗИН МАКС Асценза Агро С.А., Португалия Разрешение № 01928-ПРЗ-2/21.12.2021 г. Заповед №РД 11-561 от 17.03.2021 г. Заповед №РД 11-3049 от 14.12.2021 г.	азоксистробин - 200 г/л + тебуконазол - 200 г/л	100 мл/дка	Ечемик Срещу Мрежести петна (<i>Helminthosporium</i> spp. (<i>Pyrenophora teres</i>)) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на изкласяването) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни	втора професионална	със системно действие

		100 мл/дка	Пшеница Срещу Листни петна (Септориоза) (<i>Septoria</i> spp.) Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>tritici</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни	
		80 мл/дка	Захарно цвекло Срещу Церкоспороза (<i>Cercospora beticola</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe betae</i>) – внася се във фаза ВВСН 39-49 (листата покриват 90% от повърхността -кореноплодите са в техническа зрялост) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	21 дни	
		100 мл/дка	Минимална употреба Пшеница Срещу Мрежести петна (<i>Helminthosporium</i> spp. (<i>Pyrenophora teres</i>)) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни	
		80 мл/дка	Минимална употреба Захарно цвекло Срещу Ръжда (<i>Uromyces betae</i>) – внася се във фаза ВВСН 39-49 (листата покриват 90% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност	П	21 дни	

				за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ТРУНФО МАКС при минимални употреби. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ТРУНФО МАКС при минимални употреби.				
305.	УАСАН СУМИТОМО КЕМИКЪЛ АГРО ЮРЪП С.А.С., Франция Разрешение № 01993-ПРЗ- 1/20.12.2021 г. Заповед №РД 11-2962 от 09.12.2021 г.	бромуконазол - 300 г/л	100 мл/дка	Пшеница (зимна и пролетна) Срещу Видове септориози (<i>Septoria sp.</i>) Кафява ръжда (<i>Puccinia recondite</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Фузариоза (<i>Fusarium sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 9-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
306.	УНИВОК Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01991-ПРЗ- 2/03.04.2023 г. Заповед №РД 11-2669 от 10.11.2021 г. Заповед № РД11- 544/09.03.2023 г.	фенпиноксамид - 50 г/л протиоконазол – 100 г/л	120-150 мл продукт/дка	Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Жълто-кафяви петна (<i>Pycnophora tritici-repentis</i>), Фузариози (<i>Fusarium sp.</i>), Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>), Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), Петносване на плевите на класа (<i>Leptosphaeria nodorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	-	втора професионална	SPe8 - Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличието на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им ПРЗ с комбинирано (контактно и