

				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 9-40 л/дка				
302.	УНИВОК Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01991-ПРЗ- 2/03.04.2023 г. Заповед №РД 11-2669 от 10.11.2021 г. Заповед № РД11- 544/09.03.2023 г.	фенипикоксамид - 50 г/л протиоконазол – 100 г/л	120-150 мл продукт/дка	Зимна пшеница, Твърда пшеница, Пролетна пшеница, Спелта Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Жълто-кафяви петна (<i>Puccinia tritici-repentis</i>), Фузариози (<i>Fusarium</i> sp.), Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>), Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), Петносване на плевите на класа (<i>Leptosphaeria nodorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	-	втора професионална	SPe8 - Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличието на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им ПРЗ с комбинирано (контактно и системно) действие Да не се прилага след ВВСН 69
			120-150 мл продукт/дка	Зимно тритикале Пролетно тритикале Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), Фузариози (<i>Fusarium</i> sp.), Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>), Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото- край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	-		

			120-150 мл продукт/дка	Зимна ръж Пролетна ръж Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i> f. sp. <i>secalis</i>), Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia dispersa</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка	П	-		
303.	УНИКОРН ДФ Нюфарм САС, Франция Разрешение №01710-ПРЗ-1/23.04.2019 г. Заповед №РД 11-765/17.04.2019 г.	сяра - 700 г/кг тебуконазол - 45 г/кг	300-500 г/дка	Пшеница (зимна и пролетна) Срещу Листни петна (ран листен пригор) (<i>Septoria tritici</i>), Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>) Фузариоза (<i>Fusarium sp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 29-69 (край на братенето, видими са максимален брой братя– край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка	П	28 дни	втора професионална	