				фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ФИТОСАРКАН за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка е на лицето, прилагащо продукта.				
308.	**ФИТОСЕВ** **<u>Продукт за растителна защита с нисък риск</u>** ФитоФенд СА, Белгия Разрешение №01557-ПРЗ-1/12.03.2018 г. Заповед №РД11-361/28.02.2018 г.	COS-OGA - 12,5 г/л	200 мл/дка	**Лозя** Срещу Мана (*Plasmopara viticola*); Брашнеста мана *Uncinula/Erysiphe necator)*- 1-во приложение-преди поява на болестта Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 8-10 Вода л/дка мин/макс - 40-100 л/дка	П	-	непрофесионална	
			200 мл/дка	**Сем. Тиквови (краставици, тиквички)** Срещу Брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*) – внася се във фаза BBCH 13-73 (3-ти същински лист на главно стъбло напълно разтворен-трети плод) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс - 50 л/дка	О	-		
			200 мл/дка	**Сем. Картофови (домати, пипер)** Срещу Брашнеста мана (*Leveillulata urica*) - BBCH 13-89 (трети същински лист-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс - 75-100 л/дка	О	-		
309.	**ФЛЕКСИТИ** БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01730-ПРЗ-2/29.10.2021 г. Заповед №РД 11-1151 от 20.06.2019 г. Заповед №РД 11-2363 от 13.10.2021 г. Заповед №РД 11-975 от 17.05.2022 г.	метрафенон - 300 г/л	20-50 мл продукт /дка	**Пшеница (зимна, пролетна, твърда), спелта, тритикале** Срещу Брашнеста мана (*Erisiphe graminis)* – внася се във фаза BBCH 25-61 (видими пет братя - начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка При употребата на продукта срещу брашнеста мана при пшеницата във	П	35 дни	втора професионална	