				начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
314.	**ФЛИНТ МАКС 75 ВГ** Байер България ЕООД Разрешение № 0599-ПРЗ-3/20.12.2017 г. Заповеди №: РД 09-456/10.07.2007 г. РД 12-4/03.01.2008 г.; РД 12-65/13.06.2008 г.; РД 12-26/30.04.2009 г. Заповед №РД 11-2614/01.12.2017 г.	500 г/кг тебуконазол + 250 трифлоксистробин	0,016 % (16 г/дка)	**Лозя** Оидиум по лоза *(Oidium tuckeri)*		ябълки, грозде -14; череши - 7; кравстави-ци -3;	непрофесионална	
			0,02 % (20 г/дка)	**Ябълка** Струпясване *(Venturia inaequalis)* Брашнеста мана *(Podosphaera leucotricha)*				
			20 г/дка	**Краставици** Брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum*)				
			30 г/дка	**Череши** Бяла ръжда *(Blumeriella jaapii)*				
315.	**ФЛОСУЛ** Сулфур Милс Лимитед Франция САС, Франция Разрешение № 1789-ПРЗ-2/18.10.2022 г. Заповед №РД 11-2632/17.12.2019 г. Заповед №РД11-2142/29.09.2022 г.	сяра – 800 г/л	400 мл продукт/ дка	**Лозя (винени и десертни сортове)** Срещу Брашнеста мана (*Uncinula necator (Oidium tuckeri)*) – внася се във фаза BBCH 15-18 (пет листа са отворени-8 листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка До 3,2 л/дка/ за вегетационен период	П	5 дни	непрофесионална	
			200 мл продукт/ дка	**Домати, патладжан** Срещу Брашнеста мана (*Leveillula taurica*) – внася се във фаза първи симптоми на болестта BBCH 10-89 (пълно разтваряне на котиледоните-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията –10 Вода л/дка мин/макс - 40-150 л/дка До 1,2 л/дка/ за вегетационен период	П	3 дни		