

	заповед, определям гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващите наличности от продукта за растителна защита ФЛЕЙМ , етикетиран в съответствие с Разрешение № 01722- ПРЗ: Издание: 1/03.06.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.			Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
334	ФЛЕЙМ ДУО Албоу ТКИ д.о.о., Словения Разрешение №01706- ПРЗ-1/22.04.2019 г. Заповед №РД 11- 747/16.04.2019 г.	трибенурон (трибенурон- метил) – 250 г/кг флорасулам – 104 г/кг	6 г продукт/дка	Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, тритикале) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
			6 г продукт/дка	Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, тритикале) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
335	ФЛОНТ Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01920- ПРЗ-1/17.03.2021 г. Заповед № РД 11-459 от 05.03.2021 г.	флуазифоп-П - 125 г/л	200 мл/дка	Ябълки Срещу едногодишни житни плевели – внася се във фаза 1-3 листа (за плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Приложение в реда, да не се прилага върху повече от 30 % от повърхността на площта	П	28 дни	втора професионална	със системно действие

			150 мл/дка	Слънчоглед Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза 1-3 листа (за плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Не повече от 1 приложение за културата	П	90 дни		
			300 мл/дка	Слънчоглед Срещу многогодишни житни плевели – внося се когато многогодишните плевели са в активен растеж (10-50 см височина) Балур до 25 см височина Не повече от 1 приложение за културата	П			
			150 мл/дка	Захарно и фуражно цвекло Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза 1-3 листа (за плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Не повече от 1 приложение за културата	П	56 дни		
			300 мл/дка	Захарно и фуражно цвекло Срещу многогодишни житни плевели – внося се Когато многогодишните плевели са в активен растеж (10-50 см височина) Балур до 25 см височина Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Не повече от 1 приложение за културата	П	56 дни		
			200 мл/дка	Маслини Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза 1-3 листа (за плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	П	28 дни		
			150 мл/дка	Патладжан Срещу едногодишни житни плевели – внося се във фаза 1-3 листа (за плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Не повече от 1 приложение за културата	П	35 дни		
			250 мл/дка	Минимална употреба Патладжан Срещу многогодишни житни плевели – внося се Когато многогодишните плевели	П	35 дни		

				са в активен растеж (10-50 см височина) Балур до 25 см височина Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ФЛОНТ при патладжан за контрол на многогодишни плевели. Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ФЛОНТ при патладжан за контрол на многогодишни житни плевели, посочени в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта				
336	ФЛУЕНТ 500 СК Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01971-ПРЗ-1/20.07.2021 г. Заповед №РД 11-1604 от 12.07.2021 г.	флуфенацет – 500 г/л	48 мл/дка	Зимни зърнено-житни култури (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале) Срещу житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени) Преди или след поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
337	ФЛУРОГАРД Галеника-Фитофармация д.о.о., Словения Разрешение № 02112-ПРЗ-1/22.02.2024 г. Заповед №РД РД11-415/19.02.2024 г.	флуроксипир - 250 г/л	Продуктът ФЛУРОГАРД е идентичен на продукта за растителна защита (ПРЗ) БОНАЦА с Разрешение № 02001-ПРЗ-Издание: 1/10.03.2022 г. за пускане на пазара и употребата на ПРЗ.				втора професионална	със системно действие
338	ФЛУРОСТАР 200 Глобахем, Белгия Разрешение № 1317 – ПРЗ-1/ 01.07.2015 г. Заповед №РД 11-987/10.06.2015 г.	флуроксипир – 200 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели		Пшеница (мека и твърда) Ечемик Ръж , Овес, Царевица - 60 дни	втора професионална	
			90 мл/дка	Пшеница (мека и твърда) Ечемик Ръж , Овес. Когато се смесва с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да бъде намалена на 70 мл/дка				