

			750 мл продукт/ дка	Марули и салатни култури Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i> syn. <i>Golovinomyces cichoracearum</i>) – внася се при първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните напълно развити-пълно узряване) Брой мин/макс приложения –4 Интервал между приложенията - 15 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка До 3 л/дка/ за вегетационен период	П	3 дни		
			750 мл продукт/ дка	Ягоди Срещу Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca macularis</i> syn. <i>Podosphaera macularis</i> , <i>Podosphaera aphanis</i>) – Първо приложение от ВВСН 60 (първи отворени цветове) Брой мин/макс приложения –8 Интервал между приложенията - 9 Вода л/дка мин/макс –20-60 л/дка До 6 л/дка/ за вегетационен период	П	3 дни		
311.	ФЛОУЕТ 80 ВГ ШАРДА ЕВРОПА б.в.б.а., Белгия	Второ търговско име на ФОЛОУ 80 ВГ						
312.	МЕДЕЙРО Ф ВГ АСЦЕНЗА АГРО С.А.,Португалия Разрешение № 01967-ПРЗ- 1/20.07.2021 г. Заповед №РД 11-1589 от 12.07.2021 г.	фосетил- алуминий – 500 г/кг фолпет – 250 г/кг	400 г/дка	Лозя (винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се до ВВСН 83 (зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка Да не се консуми-рат листа от лози, третира-ни с продукта	П	28 дни	втора професионална	с комбинирано действие (системно и несистемно) Употребата на този продукт и други продукти за растителна защита употребявани при лозя, съдържащи фосетил- алуминий, калиеви фосфонати,
			400 г/дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се до ВВСН 69 (край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 10-14 дни	П	-		

				Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка Да не се консуми-рат листа от лози, третира-ни с продукта				динатриеви фосфонати и други, водещи до образуване на фосфонова киселина, да се ограничи до общо 10 кг еквивалент на фосфонова киселина/хектар за година
313.	ФЛУАЗИНОВА Финкимика С.п.А., Италия Разрешение № 02055-ПРЗ- 1/16.11.2022 г. Заповед №РД11- 2389/02.11.2022 г.	флуазилам – 500 г/л	100 мл/дка	Лозя (винени сортове) Срещу Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) – внося се във фаза ВВСН 69-85 (край на цъфтежа-омекване на зърната) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 6 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	21	втора професионална	с несистемно действие
			40 мл/дка	Картофи Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внося се във фаза ВВСН 26-85 (поява на шесто основно странично разклонение (> 5 см)-плодовете от първо плодобразуване са оцветени от охра до кафяво) Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 6 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П	7		
314.	ФОЛИКУР 250 ЕВ /ХОРИЗОНТ Байер България ЕООД Разрешение № 0552-3/ 26.01.2016 г. Заповед №РД 11- 47/13.01.2016 г.	250 г/л тебуконазол	0,04 % (40 мл/дка)	Лоза Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i>);		Лоза -21 дни; Рапица -56 дни	втора професионална	
			50-100мл/дка 100мл/дка	Рапица Фома по маслодайна рапица (<i>Phoma lingam</i>); Склеротиния по маслодайна рапица (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>);				
315.	ФОЛОУ 80 ВГ/ ФРИЛЪР 80 ВГ/ ФЛОУЕТ 80 ВГ ШАРДА ЕВРОПА б.в.б.а., Белгия Разрешение № 01295-4/30.05.2022	фолпет – 800 г/кг	187,5 г/дка	Лозя (винени сортове) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>), Черно гниене(<i>Guignardia bidwellii</i>), Бяло гниене (<i>Coniella diplodiella</i>) – внося се	П	28 дни	втора професионална	с несистемно действие

	Заповед № РД 11-246/11.02.2015 г. Заповед №РД 11-1659/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-646/19.04.2016 г. Заповед №РД 11-1622/20.08.2018 г. Заповед №РД 11-1896 от 17.08.2020 г. Заповед №РД 11-973 от 17.05.2022 г.			преди появата на първите симптоми, според прогнозата на заболяването (от ВВСН 15 –разтворени 5 листа) Брой мин/макс приложения – 8 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка Да не се консумират листа от третираните с продукта лози				
				156 г/дка Домати Срещу Мана (<i>Plasmopara infestans</i>) – внася се след ВВСН 71 (първа китка: първи плод с типичен размер) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка				
				200 г/дка Домати Срещу Мана (<i>Plasmopara infestans</i>) – внася се след ВВСН 71 (първа китка: първи плод с типичен размер) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка				
316.	ФОЛПАН 80 ВДГ Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия Удостоверение № 91/21.01.2004 г. Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. Заповед № РД11-2579/07.11.2023 г.	800 г/кг фолпет	0,15 %	Мана по лоза Сиво гниене по грозде Струпясване (<i>Venturia inaequalis</i>) по ябълка (до големина лешник)		20 дни	1	
			150 г/дка	Мана по картофи Алтернария по картофи				
			0,1 %+ Ардент 50 СК - 0,015 %	Мана по лоза Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i> , <i>Uncinula necator</i>) Сиво гниене по грозде в комбинация с Ардент 50 СК - 0,015 %				
317.	ФОЛПАН ГОЛД/РИДОМИЛ ГОЛД КОМБИ 45 ВГ Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия Разрешение № 01862-ПРЗ-2/15.06.2021 г. Заповед №РД 11-1818 от 07.08.2020 г. Заповед №РД 11-1149 от	металаксил-М – 48,5 г/кг фолпет - 400 г/кг	200 г продукт/дка	Лозя (винени сортове) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се при поява на симптоми Брой мин/макс приложения – 1-3 дни Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третираните с продукта лози	П	28 дни	втора професионална	с комбинирано действие