				Срещу Мана (*Bremia lactucae*) – внася се във фаза BBCH 12-49 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложения – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Забележки: Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ФОСИКА за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ФОСИКА за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка е на лицето, прилагащо продукта.				
323.	**ФРИЛЪР 80 ВГ** ШАРДА ЕВРОПА б.в.б.а., Белгия	**Второ търговско име на ФОЛОУ 80 ВГ**						
324.	**ФУВЪР 300 ФС** Байер България ЕООД Разрешение № 01438 –ПРЗ-1/15.09.2016 г. Заповед №РД 11-1558/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-2073/22.10.2018 г. Заповед №РД 11-1964 от 25.08.2020 г.	300 г/л - протиоконазол	15 мл/ единица семена (50 000 семена)	**Царевица** Цветна главня (*Sphacelotheca reiliana),* гниене на семената и посевите (*Fusarium* spp);		-	първа професионална	
325.	**ФУНГИСЕЙ** (продукт с нисък риск)	Bacillus subtilis щам IAB/BS03 $1x10^8$ CFU/mL	300 мл/дка	**Лозя (десертни и винени сортове)** **Маточни лозя** **Лозови вкоренилища** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) –	П	1	непрофесионална	с несистемно действие

	Разрешение № 02089-ПРЗ-1/14.07.2023 г. Заповед №РД 11-1626/06.07.2023 г.	(10 г/л технически продукт) (вещество с нисък риск)		внася във фаза BBCH 68-89 (80% опадане на ресите – плодът е готов за беритба) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			300 мл/дка	**Семкови овощни видове вкл. ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, азиатски круши (наши) и др.** Срещу Струпясване (*Venturia spp.*) – внася се във фаза BBCH 57-89 (фаза „Розов бутон“ – консумативна зрелост) Брой мин/макс приложения – 7 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3		
			300 мл/дка	**Листни зелеви култури неформиращи глави вкл. зелено зеле, китайско зеле и др.** Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum) – внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П/О	1		
			300 мл/дка	**Зелеви култури формиращи глави вкл. главесто зеле** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) – внася се във фаза BBCH 14-47 (четвърти същински лист – 70% от очаквания размер на главата е достигнат) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	1		
			300 мл/дка	**Зелеви култури формиращи съцветия и други зелеви култури, вкл. броколи и брюкселско зеле** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*)	П	1		

	Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum)* – внася се във фаза BBCH 14-47 (четвърти същински лист – образувана 70% от листната маса, характерна за вариетета) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка		
300 мл/дка	**Култури от сем. тиквови с ядлива кора вкл. краставици, корнишони, тиквички** Срещу Брашнеста мана (*Erysiphe spp., Sphaerotheca spp*.) – внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П/О	1
300 мл/дка	**Култури от сем. тиквови с неядлива кора, вкл. диня, пъпеш, тиква** Срещу Брашнеста мана (*Erysiphe spp., Sphaerotheca spp*.) – внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П/О	1
300 мл/дка	**Домати Пипер Патладжан** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) – внася се във фаза BBCH 61-89 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П/О	1
300 мл/дка	**Целина (корени и стъбла) Копър Ревен** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) – внася се във фаза BBCH 12-49	П/О	1

	Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка 20-100 л/дка вода при полски условия 40-100 л/дка вода при оранжерийни условия		
300 мл/дка	**Моркови** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) – внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори лист – край на нарастването на корена) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П/О	1
300 мл/дка	**Маруля и други салати вкл. широколистна цикория, кълрава ендивия, салата маше, романска салата, салата ракета, царевична салата, рукола, червена горчица** Срещу Мана (Bremia spp.) – внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П	1
300 мл/дка	**Маруля и други салати вкл. широколистна цикория, кълрава ендивия, салата маше, романска салата, салата ракета, царевична салата, рукола, червена горчица** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) – внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П/О	1
300 мл/дка	**Билки и растения от сем. лукови, вкл. див лук, растения от сем.**	П/О	1

	сенникоцветни вкл. копър, магданоз, керевиз,.листна целина, грудкова целина кимион, растения от сем. сложноцветни вкл. босилек, мащерка, градински чай, розмарин, чубрица, риган, майорана, исоп, мента и други подправки вкл. фини подправки, цветя, ядливи цветя и други ароматни растения, растения и култури за добив на етерични масла, лаврово дърво (дафинов лист), естрагон Срещу Мана *(Bremia spp.)* – внася се във фаза BBCH 12-67 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка		
300 мл/дка	**Билки и растения от сем. лукови вкл. див лук, растения от сем. сенникоцветни вкл. копър, магданоз, керевиз,.листна целина, грудкова целина кимион, растения от сем. сложноцветни вкл. босилек, мащерка, градински чай, розмарин, чубрица, риган, майорана, исоп, мента и други подправки вкл. фини подправки, цветя, ядливи цветя и други ароматни растения, растения и култури за добив на етерични масла, лаврово дърво (дафинов лист), естрагон** Срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) Склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*) – внася се във фаза BBCH 12-67 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П/О	1
300 мл/дка	**Градински кресон Воден кресон** Срещу Мана *(Bremia spp.)* – внася се във фаза BBCH 12-49 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П	1

			300 мл/дка	**Артишок** Срещу Мана *(Bremia spp.)* – внася се във фаза BBCH 11-59 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П	1		
			300 мл/дка	**Тютюн** Срещу Брашнеста мана *(Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.)* – внася се във фаза BBCH 12-59 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка	П	-		
			300 мл/дка	**Бадем** Срещу Струпясване (*Venturia spp.*) Охрено петно (полистигма) (*Polystigma fulvum = Polystigma ochraceum*) – внася се във фаза BBCH 51-89 Брой мин/макс приложения – 7 Интервал между прложенията – 5 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	3		
326.	**ФУНГУРАН ОН 50 ВП** Шпийс Ураниа Кемикъл ГмбХ Разрешение № 0257-ПРЗ Издание: 2/03.11.2015 г. Протоколи № 44/1998; 46/2000; 47/2001 Санитарно разрешително № 01208/18.03.2004 г. Заповед №РД 11-1510/02.10.2015 г. Заповед №РД 11-1571/19.10.2015 г. Заповед №РД 11-710 от 17.03.2020 г. Заповед №РД 11-2378 от 13.10.2021 г.	77 % меден хидрооксид (50 % Cu)	0,15 %	**Лоза** Мана по лоза		Лоза, домати, тютюн, картофи -14; Ябълка, круша, Праскова, нектарина, Кайсия, Череши, Сливи, Малини, Ягоди-неприложимо;: Орехи, Лешник -28	3	
			0,15 % 0,3 %	**Домати** Мана по домати Черно бактериално струпясване				
			0,15 %	**Праскова** Къдравост по праскова (есен - пролет, пролетно при набъбване на пъпките)				
			0,3 %	**Тютюн** Сечене на тютюневия разсад (Питиум)				
			150 г/дка	**Картофи** Мана по картофи				
			150 г/дка	**Тютюн** Див огън по тютюн				
			150-250 г/ дка	**Круша** Срещу Струпясване – внася се във фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)BBCH 99-53 -				