

				Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-200 л/дка				
			1-2 л продукт/ дка	Минимална употреба Череша Вишни Срещу Щитовосна въшка Петнистокрила дрозифила Обикновен паяжинообразуващ акар – внася се във фаза ВВСН 01-89 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-200 л/дка	П			
			1-2 л продукт/ дка	Минимална употреба Малини Къпини Боровинки Френско грозде Касис Цариградско грозде и др. Срещу Акар Листни въшки Петнистокрила дрозифила Трипси внася се във фаза ВВСН 01-89 Брой мин/макс приложения – 5 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-200 л/дка БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ ФЛИПЕР за контрол на вредители от Приложение 2. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на ПРЗ ФЛИПЕР за контрол на вредители от Приложение 2 е на лицето, прилагащо продукта.	П			
156.	ХАРПУН Галеника Фитофармация, Словения Разрешение № 01490– ПРЗ–2/15.01.2020 г. Заповед № 11- 1359/26.06.2017 г. Заповед №РД 11-55 от 07.01.2020 г.	пирипроксифен 100 г/л	50-112,5 мл/дка	Домати Белокрилки (<i>Trialeurodes vaporarum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) – внася се във фаза ВВСН 50 - 89 (първо съцветие изправена пъпка – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	О	3 дни	втора професионална	Първо третиране- при поява на възрастно насекомо. При прилагане на продукта в период на опрашване от пчелите, да бъдат затворени всички отвори на оранжерията.
			50-112,5 мл/дка	Краставици Белокрилки (<i>Trialeurodes vaporarum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) – внася се във фаза ВВСН 50 - 89 (поява на първи цвят по главното стъбло-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	О	3 дни		
			75,0-112,5 мл/дка	Корнишони Белокрилки (<i>Trialeurodes vaporarum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) –първо третиране – при поява на първи възрастни насекоми Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-14 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка	О	3 дни		
			75,0 мл/дка	Пипер Белокрилки (<i>Trialeurodes vaporarum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>) –първо третиране – при поява на първи възрастни насекоми Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10-15 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка Интервал от 10 дни се прилага когато температура-турите са над 25° С и 15 дни когато са	О	3 дни		

			50 мл/дка	Памук Белокрилки (<i>Bemisia tabaci</i>) - при нападение преди отваряне на кутийките Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка	П	-		
			100 мл/дка	Ябълки Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) – внася се във фаза ВВСН 71-74 (размер на завръза до 10 мм, след-цъфтежно окапване – размер на плода до 40 мм) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка	П	-		
			100 мл/дка	Круши Крушова листна бълха (<i>Cacopsylla pyricola</i>) – внася се във фаза ВВСН 51 – 75 (набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка	П	-		
			30 мл/дка	Ябълки, Круши Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Черничева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)-внася се при поява на първите ларвни стадии. За предпочитане срещу първото поколение, преди цъфтеж. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	-		
			24,0–30,0 мл/дка	Праскови Нектарини Черничева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се във фаза При поява на първите ларвни стадии. За предпочитане срещу първото поколение, преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка	П	-		
157.	ХЕЛИКОВЕКС ЕТ Агробиоконсулт, България Разрешение № 01344 – ПРЗ-1/18.11.2015 г. Заповед №РД 11- 1653/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-566 от 28.03.2022 г.	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (<i>Hear NVP, DSMZ- BV0003</i>) – 7.5 x 10 ¹² вирусни тела/литър	20 мл/дка	Домати, патладжан, фасул, грах, пълеш, праз, краставици, тиквички, маруля, тютюн, декоративни култури, царевича, сладка царевича, пресни подправки: Срещу Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>) - първо третиране –преди излюпване на първите гъсеници Брой мин/макс приложения - макс. 12/ вегетационен период Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден Да се пръска привечер	П	1 ден	непрофесионална	
158.	ХИНОДЕ ИСК Биосайансис Юръп Н.В, Белгия Разрешение № 01756- ПРЗ-2/20.05.2020 г. Заповед №РД 11- 1717/20.07.2019 г. Заповед №РД 11-1007 от 18.05.2020 г.	флонирамид 500 г/кг	Продуктът е идентичен на продукта за растителна защита ТЕПЕКИ, разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01440 – ПРЗ, издание 2/07.11.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.			втора професионална		Със системно действие
159.	ЦАЙПЕР 10 ЕК К и Н Ефтимиадис България ЕООД	Второ търговско име на ЕФИЦИМЕТРИН 10 ЕК						SPe8 - Опасен за пчелите
160.	ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК К и Н Ефтимиадис България ЕООД	Второ търговско име на ЕФИЦИМЕТРИН 10 ЕК						SPe8 - Опасен за пчелите