

						28 за маслини събрани от земята		
			400-700 мл/дка	Цитрусови култури Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой-плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) и ВВСН 89-00 (консумативна зрялост-покой) След поникването на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
353	ХЕМНИКО 24 СК / МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК ФМС Агро България” ЕООД Удостоверение №01148-2/12.07.2013г. Заповед №РД 11-369 от 02.03.2022 г. Заповед №РД11-1416/09.06.2023 г.	240 г/л никосулфу рон		Срещу: многогодишни житни плевели (обикновен пирей и балур); едногодишни житни плевели (лисича опашка, едногодишна метлица, райграс и кощрява); едногодишни широколистни плевели (обикн.звездича, абутилон, щир, лепка, пача трева, и див синап)		-	2	
			21 мл/дка	Царевина Фази на приложение : ВВНС 16-18 Количество на работния разтвор : 10 – 30 л/дка				
354	ХЕМТРИБЕ 75 ВГ НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия Разрешение№01160-ПРЗ-2/07.11.2018 г. Заповед №РД11-1366/19.11.2012 г. Заповед №РД 11-2155/23.10.2018 г.	750 г/кг трибенурон метил		Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди при:		30 дни	3	
			1,5 г/дка	Пшеница, Ечемик – внася се във фаза ВВСН 13 – 29 във фенофаза братене на културите и фенофаза на широколистните плевели 2-4-ти лист Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка				
355	ХИЛЕО НТ Каф КАРИОН СЛ, Испания Разрешение № 02120-ПРЗ-1/12.04.2024 г.	глифозат – 360 г/л	300-600 мл/дка	Лозя Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели - Възраст на културата минимум 4 години След поникване на плевелите (активно развиващи се плевели) Брой мин/макс приложения – 1	П	-	втора професионална	тотален хербицид със системно действие